

日本薬局方 **ヨクイニン**
第3類医薬品

△ 使用上の注意

⊗ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用がおこりやすくなります)
授乳中の人は本剤を服用しないか、本剤を服用する場合は授乳を避けてください。

🗨️ 相談すること

- 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
(1) 医師の治療を受けている人
(2) 妊婦又は妊娠していると思われる人
- 次の場合は、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

服用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症 状
消化器	胃部不快感

- 1ヶ月位服用しても症状がよくなる場合は、服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

▲用法及び用量

成人(15歳以上)は1日量30gを水約600mlをもって煮て約400mlに煮詰め、かすをこして取り去り、食前又は食間3回に分服する。

<用法・用量に関する注意>

◎服用に際して、定められた用法・用量を守り、正しくお使いください。

▲効能及び効果

いぼ、皮膚の荒れ

▲保管及び取り扱い上の注意

- 直射日光の当たらない、湿気の少ない、涼しい所に保管してください。
- 小児の手の届かない所に保管してください。
- 他の容器に入れ替えないでください。
- 開封後はなるべく早く使用し、長く保管しないでください。
- 煎薬の場合は、腐敗防止のため煎液を冷所に保管してください。
- 服用に際しては、説明書をよくお読みください。

品質には常に細心の注意をはらっておりますが、本品は天然物(生薬)の性質上、吸湿してカビが生えたり、虫がつくことがあります。

万一不良品がございましたら開封後でもお取替えいたします。



副作用被害救済制度の問合せ先
(独) 医療品医療機器総合機構
<http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai.html>
電話 0120-149-931 フリーダイヤル

吉見製薬株式会社 大阪市中央区船越町2-1-17
電話 06(6941)7164

LOT



4 951225 123271