

日本薬局方

第3類医薬品

吉見ヨクイニン末

用法及び用量

大人(15歳以上)は1回量2g、1日3回、食前
又は食間に服用する

効能又は効果

いぼ、皮膚のあれ



4951225423272

日本薬局方

ヨクイニン末

第3類医薬品

⚠ 使用上の注意



相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
 - (1) 医師の治療を受けている人。
 - (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
2. 次の場合は、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

服用後、次の症状が現れた場合

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

関係部位	症 状
消化器	胃部不快感

3. 1ヶ月位服用しても症状が良くならない場合は、服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

▲ 用法及び用量

大人(15歳以上)は1回量2g、1日3回、食前または食間に服用してください。

<用法・用量に関する注意>

◎服用に際して、定められた用法・用量を守り、正しくお使いください。

▲ 効能及び効果

いぼ、皮膚のあれ

▲ 保管及び取り扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない、湿気の少ない、涼しい所に保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。
- (4) 開封後はなるべく早く使用し、長く放置しないでください。
- (5) 服用に際しては、説明書をよくお読みください。

品質には常に細心の注意をはらっておりますが、本品は天然物(生薬)の性質上、吸湿してカビが生えたり、虫がつくことがあります。万一不良品がございましたら開封後でもお取替えいたします。

吉見製薬株式会社

大阪市中央区船越町 2-1-17

電話 06(6941)7164

