

この添付文書はお薬とともに保管し、ご使用の際にはよくお読みください。

**発毛促進剤**  
第2類医薬品

# ハツモール・ヘアーグロアー、S

[この商品は男女兼用です]

ハツモール・ヘアーグロアー、Sは、医薬品として薄毛、発毛促進に効果のある有効成分を複数配合した発毛促進剤です。

ハツモール・ヘアーグロアー、Sはエストラジオール安息香酸エステル（女性ホルモン）を含む9種の有効成分の総合的な働きにより、若禿、生え際の薄毛、円形脱毛症、脂性脱毛症の他、発毛促進、脱毛の予防に効果を発揮する医薬品の発毛促進剤です。

頭皮の過剰な皮脂分泌を正常にし、毛細血管の働きが活性化され、毛乳頭細胞の賦活作用により、毛根部の障害を回復し、発毛を促進します。

## ⚠ 使用上の注意



### してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなる)

次の部位には使用しないでください。

- (1) きず、湿疹あるいは炎症（発赤）等のある頭皮
- (2) 頭皮以外



### 相談すること

1. 次の人は使用前に医師または薬剤師に相談してください。

- (1) 妊婦または妊娠していると思われる人
- (2) 本人または家族がアレルギー体質の人
- (3) 薬や化粧品等によるアレルギー症状を起こしたことがある人

2. 次の場合は直ちに使用を中止し、この添付文書を持って医師又は薬剤師に相談してください。

使用後、次の症状があらわれた場合

(使用を中止し、水またはぬるま湯で洗い流してください。)

関係部位	症 状
頭 皮	発疹、発赤、はれ、かゆみ、かぶれ、痛み
その他の部位	悪心、頭痛

3. 次の場合は、直ちに使用を中止し、医師または薬剤師もしくは弊社（お客様相談室）に相談してください。

- (1) 頭皮がふけ状（角層）にはがれる症状があらわれた場合
- (2) 本剤の使用後によく手を洗っても、手（指先）が荒れる場合

## 効能・効果

- 若禿、脂性脱毛症、円形脱毛症 ● 発毛促進、脱毛の予防、薄毛、生え際の薄毛  
 ● ふけ、かゆみ ● 病後・産後の脱毛


若禿

円形脱毛症

抜け毛

ふけ・かゆみ

病後・産後の抜け毛



## 用法・用量

下記の量を頭皮にふりかけ、指頭にてよくマッサージしてください。(マッサージ後はよく手を洗い流してください)

一回量	1日の使用回数
適量(2~3mLが適当です)	2~3回

※一回に多量に使うよりは、適量を毎日継続して使う方が効果的です。



〈使用に際しては次の点に注意してください〉

- アレルギー体質の方、皮膚の弱い方は、ご使用前に必ずパッチテスト(腕の内側ややわらかい部分に塗布し、48時間そのままにする)を行なってください。異常があらわれた時は使用しないでください。
- 本剤の使用により、白髪の方は髪の色が茶褐色になるため、白髪を保ちたい方は使用しないでください。
- 用法・用量を厳守してください。
- 洗髪後の使用は効果的ですが、湯上がり直後は発汗しやすいので、ほてりをさましてから使用してください。
- 小児に使用する場合には保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- 目に入らないように注意してください。万一、目に入った場合には、すぐに水またはぬるま湯で洗ってください。  
なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けてください。
- 液のついた手で、目など粘膜にふれると刺激があるので、手についた液は、よく洗い落としてください。
- 本剤は頭皮のみに使用し、飲まないでください。

## 成分・分量(100g中)

成 分	分 量	働き
エストラジオール安息香酸エステル	0.001 g	ホルモンバランスを取り戻し、脱毛を抑える。過剰な皮脂の分泌を抑制する。
ジフェンヒドラミン塩酸塩	0.2 g	抗ヒスタミン作用があり、かゆみを抑える。
ピリドキシン塩酸塩	0.03 g	皮脂腺の動きを正常化し、過剰な皮脂の分泌を抑制する。
トコフェロール酢酸エステル	0.009 g	毛細血管の血行をよくする。活性酸素から身体を守り、老化を防ぐ。
パントテン酸カルシウム	0.3 g	毛髪や皮膚の栄養状態を整える。
サリチル酸	2.6 g	角質軟化作用により、有効成分の浸透をよくする。
ヒドロコルチゾン	0.0016 g	炎症を抑える作用があり、腫れや赤み、かゆみを抑える。
レゾルシン	3.0 g	殺菌、抗菌作用によりフケを抑え、頭皮を清潔に保つ。
ヒノキチオール	0.26 g	殺菌、抗菌作用によりフケを抑える。細胞を活性化させる。

添加物 : I-メントール、トウガラシチンキ、1,3-ブチレングリコール、グリセリン、ポリオキシエチレンヒマシ油、pH調整剤、香料、エタノール

## 保管および取扱い上の注意

- 小児の手の届かない所に保管してください。
- 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管してください。
- 誤用をさけ、品質を保持するため、他の容器に入れかえないでください。
- 火気に近づけないでください。
- アルコールなどで溶けるおそれのあるもの(メガネのわく、化学繊維など)には、つかないようにしてください。
- 洗面化粧台、壁、床や衣類等に付着したままにしておくと、シミになる場合があるので、すぐに洗い流すかあるいはふきとってください。特に壁紙やクッションフロア等は本剤が浸透し、シミになりますので注意してください。  
(本剤は微黄色のため、使用時に液が飛び散っても分かりにくいので、注意してください)
- 本剤使用後にかいた汗で、衣類、帽子等がシミになる場合があるので、注意してください。
- 整髪料およびヘアスプレーは、本剤を使用した後に使用してください。ヘアカラー後に使用する場合は、衣類や枕カバー等への色移りが起こりやすくなることがあるので、注意してください。
- パーマ・ヘアカラー直後は頭皮が敏感になっているため、施術後の本剤使用に際しては、注意してください。
- 本剤は外装に記載されている使用期限内に使用してください。



## 包 装

170mL / 230mL

本品についてのお問い合わせは、お買い求めのお店または下記までご連絡下さいますようお願い申し上げます。

株式会社 田村治照堂 お客様相談室

住 所 : 〒546-0035 大阪市東住吉区山坂3-6-15

電 話 : 06-6622-6482 受付時間 : 月~金曜日 9:00~17:00 (祝祭日を除く)