

使用前にこの説明書を必ずお読みください。また、必要なときに読めるよう保管してください。

目薬

目の疲れ・  
充血に

V・ロート  
第2類医薬品  
ROHTO® 13mL

## 目にすがすがしいスタンダード目薬。

酷使されやすく、  
疲れやすくなるようです。  
目が疲れたら無理をしないで、  
ちよつと休憩。そして「V・ロート」。



視覚の役割をはたす目は  
他の感覚器官に比べて、とても  
複雑な構造と機能を持っています。  
役割が大切なだけに、

### 〔成分〕

- ビタミンB<sub>6</sub>
- L-アスパラギン酸カリウム
- ネオスチグミンメチル硫酸塩
- ナファゾリン塩酸塩
- クロルフェニラミンマレイン酸塩
- アラントイン

### 〔はたらき〕

- ・目の細胞の新陳代謝を促進し
- ・目の細胞呼吸を促進、活性化し
- ・ピント調節筋に働いて回復を促し
- ・結膜(白目の部分)充血を取り除き
- ・抗ヒスタミン剤として目のかゆみを
- ・抗炎症作用を発揮して

目の疲れに効果的

クリアな瞳に

きちんと鎮める

眼病予防に効果的

いつでも、どこでも、スムーズに点眼できる  
フリーアングルノズル®



簡単にアイケアできて、とっても便利です。

ワンタッチ式スクリュウキャップ



開ける時は左に1回カチッと回し、閉める時も  
右に1回カチッと回すだけ。簡単便利です。



## 使用上の注意

### 相談すること



1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。

- (1) 医師の治療を受けている人
- (2) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人
- (3) 次の症状のある人  
はげしい目の痛み
- (4) 次の診断を受けた人  
緑内障

2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。

関係部位	症 状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
目	充血、かゆみ、はれ、しみて痛い

3. 次の場合は使用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。

- (1) 目のかすみが改善されない場合
- (2) 5～6日間使用しても症状がよくなる場合

## 効能・効果

目の疲れ、結膜充血、目のかすみ(目やにの多いときなど)、目のかゆみ、眼病予防(水泳のあと、ほこりや汗が目に入ったときなど)、眼瞼炎(まぶたのただれ)、紫外線その他の光線による眼炎(雪目など)、ハードコンタクトレンズを装着しているときの不快感

## 用法・用量

1回2～3滴、1日5～6回点眼してください。

### 用法・用量に関連する注意

- (1) 過度に使用すると、異常なまぶしさを感じたり、かえって充血を招くことがありますので用法・用量を厳守してください。
- (2) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (3) 容器の先を目やまぶた、まつ毛に触れさせないでください。  
〔汚染や異物混入(目やにやホコリ等)の原因となる〕  
また、混濁したものは使用しないでください。
- (4) ソフトコンタクトレンズを装着したまま使用しないでください。
- (5) 点眼用にのみ使用してください。

容器の先と



目やまつ毛が  
ふれること  
ないように

## 成 分

ビタミンB <sub>6</sub> .....0.1%	クロルフェニラミンマレイン酸塩.....0.01%
アラントイン.....0.06%	ネオスチグミンメチル硫酸塩.....0.003%
L-アスパラギン酸カリウム.....1%	ナファゾリン塩酸塩.....0.003%

添加物として、ホウ酸、ホウ砂、*l*-メントール、*d*-カンフル、プロピレングリコール、ペパーミントオイル、ユーカリ油、*d*-ボルネオール、クロロブタノール、ベンザルコニウム塩化物、ポリソルベート80、エタノールを含有します。

## 保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管してください。品質を保持するため、自動車内や暖房器具の近くなど、高温の場所(40℃以上)に放置しないでください。
- (2) キャップを閉める際は、カチッとするまで回して閉めてください。
- (3) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (4) 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わる)
- (5) 他の人と共用しないでください。
- (6) 使用期限(外箱に記載)を過ぎた製品は使用しないでください。なお、使用期限内であっても一度開封した後は、なるべく早くご使用ください。
- (7) 保存の状態によっては、成分の結晶が容器の先やキャップの内側につくことがあります。その場合には清潔なガーゼ等で軽くふきとってご使用ください。
- (8) 容器に他の物を入れて使用しないでください。



## お問い合わせ先:お客さま安心サポートデスク

この商品をお使いになってのご意見・ご要望、またご不満な点などをお聞かせいただけませんか。「あなたに伝えたい」サポートデスクです。

東京:03-5442-6020 大阪:06-6758-1230

受付時間 9:00～18:00(土、日、祝日を除く)