



アラントイン配合 新ロート目薬

パソコン・ワープロ、テレビに読書…。近年目を酷使する機会がますます増え、目の疲れに悩む方が増えています。また、スモッグやホコリなどで汚れた空気の刺激で目に小さな傷ができ、炎症や充血を起こすこともたびたびです。

新ロート目薬は、炎症を抑える成分や目の調節機能を高める成分の配合で、疲れ・充血・かゆみなどの不快症状を取り除き、大切な目を健やかに保ちます。

新ロート目薬の特長

- ① **アラントイン**には抗炎症作用や目の傷の治りを助ける作用があり、外からの刺激にさらされて傷みがちな目に働き、炎症をしずめるとともに眼病を予防します。
- ② **ネオスチグミンメチル硫酸塩**は目の調節機能を回復させる働きがあり、目の疲れにすぐれた効果を発揮します。
- ③ **硫酸亜鉛水合物**はすぐれた消炎作用を持っていますので、炎症によって起こる充血やかゆみを和らげます。



使用上の注意

相談すること



1. 次の人は使用前に医師又は薬剤師にご相談ください。
 - (1) 医師の治療を受けている人
 - (2) 本人又は家族がアレルギー体質の人
 - (3) 薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人
 - (4) 次の症状のある人
はげしい目の痛み
 - (5) 次の診断を受けた人
緑内障
2. 次の場合は、直ちに使用を中止し、この説明書を持って医師又は薬剤師にご相談ください。
 - (1) 使用后、次の症状があらわれた場合

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
目	充血、かゆみ、はれ、しみて痛い

- (2) 目のかすみが改善されない場合
- (3) 2週間位使用しても症状がよくなる場合

効能・効果

目の疲れ、眼瞼炎(まぶたのただれ)、結膜充血、紫外線その他の光線による眼炎(雪目など)、眼病予防(水泳のあと、ほこりや汗が目に入ったときなど)、目のかゆみ、目のかすみ(目やにの多いときなど)、ハードコンタクトレンズを装着しているときの不快感

用法・用量

1回2~3滴、1日5~6回点眼してください。

用法・用量に関連する注意

- (1)小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (2)容器の先をまぶた、まつ毛に触れさせないでください。〔汚染や異物混入(目やにやホコリ等)の原因となる〕また、混濁したものは使用しないでください。
- (3)ソフトコンタクトレンズを装着したまま使用しないでください。
- (4)点眼用にのみ使用してください。




有効成分

有効成分	配合量
アラントイン	0.1%
硫酸亜鉛水和物	0.1%
ネオスチグミンメチル硫酸塩	0.002%

添加物として、ホウ酸、ホウ砂、L-アスパラギン酸Mg、L-アスパラギン酸K、ベンザルコニウム塩化物、クロロブタノール、*l*-メントール、ポリソルベート80、エタノールを含有します。

保管及び取扱い上の注意

- (1)直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管してください。
品質を保持するため、自動車内や暖房器具の近くなど、高温の場所(40℃以上)に放置しないでください。
- (2)小児の手の届かない所に保管してください。
- (3)他の容器に入れ替えないでください。
(誤用の原因になったり品質が変わる)
- (4)他の人と共用しないでください。
- (5)使用期限(外箱に記載)を過ぎた製品は使用しないでください。
なお、使用期限内であっても一度開封した後は、なるべく早くご使用ください。
- (6)保存の状態によっては、成分の結晶が容器の先やキャップの内側につくことがあります。その場合には清潔なガーゼ等で軽くふきとってご使用ください。
- (7)容器に他のものを入れて使用しないでください。



お問い合わせ先;お客さま安心サポートデスク

この商品をお使いになってのご意見・ご要望、またご不満な点などをお聞かせいただけませんか。「あなたに伝えたい」サポートデスクです。

東京:03-5442-6020 大阪:06-6758-1230

受付時間 9:00~18:00(土、日、祝日を除く)

ROHTO

ロート製薬株式会社
大阪市生野区巽西1-8-1

400022906