

この説明文書はお薬とともに保管し、使用の際にはよくお読みください。

説明文書改訂年月  
2013年2月  
(記載要領変更に伴う改訂)

①

ものもらい・結膜炎・目のかゆみに

# 抗菌目薬

(販売名：サララ抗菌目薬)

第2類医薬品

ブドウ球菌などのいろいろな細菌の感染によって起こる目の病気には、結膜炎、ものもらいなどがあります。

サララ抗菌目薬は、このような細菌に対して抗菌作用のあるサルファ剤・スルファメトキサゾールナトリウムと、目の炎症やかゆみを抑えるイブシロン-アミノカプロン酸を配合した目薬で、ものもらい、はやり目、まぶたのただれ、目のかゆみにすぐれた効果をあらわします。

## ■サララ抗菌目薬の特長

- ・スルファメトキサゾールナトリウムは、すぐれた抗菌作用をもつサルファ剤で、細菌感染によって起こる結膜炎、ものもらいなどにすぐれた治療効果をあらわします。
- ・イブシロン-アミノカプロン酸は、消炎作用があり、結膜炎などで起こる症状を改善します。



## 使用上の注意



### してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる)

長期連用しないこと



### 相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
  - (1) 医師の治療を受けている人。
  - (2) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
  - (3) 次の症状のある人。  
はげしい目の痛み
2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
目	充血、かゆみ、はれ

3. 3～4日間使用しても症状がよくなる場合は使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

(裏面もお読みください)

## 〔用法・用量〕

1日3～6回、1回1～3滴点眼してください。

## 〔用法及び用量に関連する注意〕

- (1) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させること。
- (2) 容器の先をまぶた、まつ毛に触れさせないこと。また、混濁したものは使用しないこと。
- (3) ソフトコンタクトレンズを装着したまま使用しないこと。
- (4) 点眼用にのみ使用すること。

## 〔効能・効果〕

結膜炎（はやり目）、ものもらい、眼瞼炎（まぶたのただれ）、目のかゆみ

### ◎「ものもらい」についての注意

まぶたをこすったり、その他、目に刺激を加えないように注意すること。

（なお、ものもらいは体質的に起こり易い場合があるが、過労や睡眠不足などで体力が低下しているときに起こり易いので疲労をさけ、睡眠を十分とるよう心掛けること。）

## 〔成分・分量〕 100mL中

スルファメトキサゾールナトリウム ……………4,000mg

イブシロン-アミノカプロン酸 ……………1,000mg

添加物として、ホウ酸、ホウ砂、チオ硫酸Na水和物、メチルパラベン、プロピルパラベン、フェニルエチルアルコールを含有します。

## 〔保管及び取扱い上の注意〕

- (1) 直射日光の当たらない、涼しい所に密栓して保管すること。
- (2) 小児の手の届かない所に保管すること。
- (3) 他の容器に入れ替えないこと。（誤用の原因になったり品質が変わる。）
- (4) 他の人と共用しないこと。
- (5) 使用期限を過ぎた製品は使用しないこと。
- (6) 一度開封したものは、使用期限内でも長期保存による使用は避けること。

本製品内容についてのお問い合わせは、お買い求めのお店又は下記にお願い申し上げます。

発売元：天野商事株式会社 お客様相談室

電話：(052)951-2340

受付時間：9:00～17:00（土、日、祝日、特定休日を除く）

製造販売元：明治薬品株式会社 お客様相談室

電話：(03)3253-3451

受付時間：9:00～17:00（土、日、祝日、特定休日を除く）

発売元



**天野商事株式会社**

名古屋市中央区丸の内三丁目13番12号

製造販売元



**明治薬品株式会社**

富山県富山市三郷6番地