

鼻かぜ(急性鼻炎)

アレルギー性鼻炎

による諸症状の緩和に

ご使用の前に、この添付文書を必ずお読みください。
また、必要なときに読めるように大切に保管してください。

くしゃみ
鼻みず、鼻づまり
なみだ目…

第②類医薬品

オムニン鼻炎カプセルS

オムニン鼻炎カプセルSは「鼻かぜ」や「アレルギー性鼻炎」による「くしゃみ」、「鼻みず」、「鼻づまり」、「なみだ目」、「のどの痛み」、「頭が重い」などの不快な症状をやわらげます。

⚠ 使用上の注意



してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなります。)

1. 次の人は服用しないで下さい。

- (1) 本剤又は本剤の成分、鶏卵によりアレルギー症状を起こしたことがある人
- (2) 次の症状のある人：前立腺肥大による排尿困難
- (3) 次の診断を受けた人：高血圧、心臓病、甲状腺機能障害、糖尿病

2. 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も服用しないでください。

他の鼻炎用内服薬、抗ヒスタミン剤を含有する内服薬等（かぜ薬、鎮咳去痰薬、乗物酔い薬、アレルギー用薬等）、胃腸鎮痛鎮痙薬

3. 服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないでください。（眠気や目のかすみ、異常なまぶしさ等の症状があらわれることがあります。）

4. 長期連用しないでください。



相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

- (1) 医師の治療を受けている人
- (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人
- (3) 授乳中の人
- (4) かぜ薬、鎮咳去痰薬、鼻炎用内服薬等により、不眠、めまい、脱力感、震え、動悸を起こしたことがある人
- (5) 高齢者
- (6) 薬などにより、アレルギー症状を起こしたことがある人
- (7) 次の症状のある人：高熱、排尿困難
- (8) 次の診断を受けた人：緑内障、心臓病、腎臓病
- (9) モノアミン酸化酵素阻害剤（セレギリン塩酸塩等）で治療を受けている人

2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	吐き気・嘔吐、食欲不振
精神神経系	めまい、不眠、神経過敏、頭痛、けいれん
泌尿器	排尿困難
その他	顔のほてり、異常なまぶしさ

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症 状
ショック (アナフィラキシー)	服用後すぐに、皮膚のかゆみ、じんましん、声のかすれ、くしゃみ、のどのかゆみ、息苦しさ、動悸、意識の混濁等があらわれる
皮膚粘膜眼症候群 (ステイブンスジョンソン症候群)、 中毒性表皮壊死 融解症	高熱、目の充血、目やに、唇のただれ、のどの痛み、皮膚の広範囲の発疹・発赤等が持続したり、急激に悪化する。
再生不良性貧血	青あざ、鼻血、歯ぐきの出血、発熱、皮膚や粘膜が青白くみえる、疲労感、動悸、息切れ、気分が悪くなりくらっとする、血尿等があらわれる。
無顆粒球症	突然の高熱、さむけ、のどの痛み等があらわれる。

裏面もお読みください。

3. 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
口のかわき、眠気、便秘、目のかすみ
4. 5～6日間服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

【成分・分量】

6カプセル(成人1日量)中

成分	分量	主な作用
抗ヒスタミン剤	d-クロルフェニラミンマレイン酸塩 6.0mg	抗ヒスタミン作用により、くしゃみ、鼻みずのアレルギー症状を抑えます。
副交感神経遮断剤	ベラドンナ総アルカロイド 0.4mg	鼻汁・なみだ液分泌抑制作用により、鼻みず及びなみだ目を抑えます。
消炎酵素剤	リゾチーム塩酸塩 75.0mg (力価)	抗炎症作用により、鼻粘膜の腫れを抑え、鼻の通りをよくします。
交感神経興奮剤	プソイドエフェドリン塩酸塩 120.0mg	鼻粘膜血管収縮作用により、鼻粘膜の充血を控え、鼻づまりを解消します。
カフェイン剤	無水カフェイン 120.0mg	脳の血管に働いて、頭重感をやわらげます。

添加物として、グリセリン脂肪酸エステル、サラシミツロウ、中鎖脂肪酸トリグリセリド、コハク化ゼラチン、グリセリン、酸化チタンを含有しています。

【効能・効果】

急性鼻炎、アレルギー性鼻炎又は副鼻腔炎による次の諸症状の緩和：くしゃみ、鼻みず、鼻づまり、なみだ目、のどの痛み、頭重

【用法・用量】

下記の1回量を食後水又は温湯で服用してください。

年齢	1回量	1日服用回数
成人(15才以上)	2カプセル	3回
7才以上15才未満	1カプセル	
7才未満	使用しないこと。	

- 定められた用法・用量を厳守してください。
- 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。
- カプセルの取り出し方(シートごと飲み込むと、のどに突き刺さるなど思わぬ事故につながる場合があります)




【保管及び取扱い上の注意】

- 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- 小児の手の届かない所に保管してください。
- 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり、品質が変わることがあります。)
- 使用期限の過ぎた製品は、服用しないでください。

本品に関するお問い合わせ

オール薬品工業株式会社 くすり相談室
〒661-0953 兵庫県尼崎市東園田町2丁目106番地
TEL (06) 6491-6222
電話受付時間：月～金(祝・祭日を除く)
9:00～17:00

製造販売元

 **オール薬品工業株式会社**
兵庫県尼崎市東園田町2丁目106番地