

この説明書は、使用前によくお読みください。
 なお、使用が終わるまで大切に保管してください。

コフチールのトローチS

指定医薬部外品

口腔咽喉薬

販売名：トローチS

トローチSは、セチルピリジニウム塩化物水和物とキキョウエキスを配合したトローチ剤で、口腔内の殺菌・消毒、口臭の除去、のどの痛み、のどのはれ、のどのあれ、声がれ、のどの不快感に効果が認められます。

⚠ 使用上の注意



相談すること

1. 次の人は使用前に医師、歯科医師又は薬剤師に相談してください。

- (1) 医師又は歯科医師の治療を受けている人。
- (2) 本人又は家族がアレルギー体質の人。
- (3) 薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人。

2. 次の場合は、直ちに使用を中止し、この文書を持って医師、歯科医師又は薬剤師に相談してください。

- (1) 使用后、次の症状があらわれた場合

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消 化 器	悪心

- (2) 5～6日間使用しても症状がよくなる場合

【効能・効果】

- のどの炎症による次の症状：のどの痛み・のどのはれ・のどのあれ・声がれ・のどの不快感
- 口腔内の殺菌・消毒
- 口臭の除去

【用法・用量】

次の1回量を、口中に含み、かまずにゆっくり溶かしてください。


使用間隔は、2時間以上おいてください。

年 齢	1 回 量	1 日 使 用 回 数
成人（15歳以上）	1 錠	6 回
11歳以上15歳未満		
8 歳以上11歳未満		
5 歳以上 8 歳未満		
5 歳未満の乳幼児	使用しないでください。	

<用法・用量に関連する注意>

- 1.用法・用量を厳守してください。
- 2.小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- 3.本剤はトローチ剤ですので、かみ砕いたり、のみ込んだりしないでください。
- 4.本剤は5歳未満の乳幼児には、使用させないでください。
- 5.トローチ剤の取り出し方

右図のようにトローチ剤の入っているPTPシート凸部を指先で強く押して裏側のアルミ箔を破り、取り出してください。(誤ってそのまま飲み込んだりすると食道粘膜に突き刺さるなど思わぬ事故につながります。)



【成分・分量と作用】

1錠(1.2g)中に次の成分を含有しています。

成分	分量	作用
セチルピリジニウム塩化物水和物	1mg	殺菌作用をもち細菌の感染を予防します。
キキョウエキス (原生薬換算量)	25mg (100mg)	気道の粘液分泌を増加させます。

添加物として、精製白糖、脱脂粉乳、粉末還元麦芽糖水アメ、ゼラチン、マクロゴール6000、ポビドン、ステアリン酸カルシウム、黄色5号、香料を含有します。

【保管及び取扱い上の注意】

- 1.直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- 2.小児の手の届かない所に保管してください。
- 3.他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わります。)
- 4.本剤は吸湿性をもっています。アルミ袋を開封し、日数を経ると湿気の多いときは、変色することがあります。ご使用の残りは、特に湿気に注意し、変色したものは、使用しないでください。
- 5.使用期限(外箱に記載)をすぎた製品は使用しないでください。

本剤をご使用になられて、何かお気づきの点がございましたら、下記までご連絡頂きますようお願い致します。

福地製薬株式会社

TEL：0748-52-2323

受付時間 9時から17時まで(土、日、祝日を除く)

発売元 福地製薬株式会社
滋賀県蒲生郡日野町寺尻824

製造販売元 日新薬品工業株式会社
滋賀県甲賀市甲賀町田堵野80-1