

のどの痛み、イガイガに


抗ヒスタミン剤クロルフェニラミンマレイン酸塩配合

ペレックス® トローチ

Pelex® troche

〈口腔咽喉薬〉

第2類
医薬品



- 殺菌剤 セチルピリジニウム塩化物水和物
□腔内を殺菌・消毒し、口臭を除去します。
- 抗ヒスタミン剤 クロルフェニラミンマレイン酸塩
炎症をしずめ、のどの痛み・はれを改善します。
- 抗炎症剤 グリチルリチン酸二カリウム
炎症をしずめ、のどの痛み・はれを改善します。



使用上の注意



してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなります)

1. 本剤を使用している間は、次のいずれの医薬品も使用しないでください。
抗ヒスタミン剤を含有する内服薬等(かぜ薬、鎮咳去痰薬、鼻炎用内服薬、乗物酔い薬、アレルギー用薬、他の口腔咽喉薬(トローチ剤)等)
2. 使用後、乗物又は機械類の運転操作をしないでください。
(眠気等があらわれることがあります。)



相談すること

1. 次の人は使用前に医師、歯科医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
(1)医師又は歯科医師の治療を受けている人
(2)妊婦又は妊娠していると思われる人
(3)薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人
(4)次の症状のある人：排尿困難
(5)次の診断を受けた人：緑内障
2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関係部位	症 状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
泌尿器	排尿困難

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症 状
再生不良性貧血	青あざ、鼻血、歯ぐきの出血、発熱、皮膚や粘膜が青白くみえる、疲労感、動悸、息切れ、気分が悪くなりくらっとする、血尿等があらわれる。
無顆粒球症	突然の高熱、さむけ、のどの痛み等があらわれる。

3. 使用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、使用を中止し、医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
□のかわき、眠気
4. 5～6日間使用しても症状がよくなる場合は使用を中止し、この説明文書を持って医師、歯科医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

効能・効果

- のどの炎症によるのどの痛み・のどのはれ・のどのあれ・のどの不快感・声がれ
- 口腔内の殺菌・消毒 ●口臭の除去

用法・用量

次の量を口の中に含み、かみ砕かずにゆっくり溶かしてください。

年齢	成人 (15歳以上)	小児 (5歳以上15歳未満)	5歳未満
1回量	1個	1個	使用しないで ください。
1日使用回数	4~6回	2~3回	

【用法・用量に関連する注意】

- (1)用法・用量を厳守してください。
- (2)小児(5歳以上15歳未満)に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (3)本剤はトローチ剤ですので、かみ砕いたり、そのままのみこんだりしないでください。


【のみこまないために】

ベレックストローチは、厚さ0.3mmのフィルム状の円形のトローチです。下図のようにトローチを手にとって舌にのせ、口を閉じると上あごにうまくつき、のみこみにくなります。

① 取りだす。



② 手に取り、舌にのせる。



③ 口を閉じて 上あごにつける。



④ そのままのみこま ないでください。

成分と働き

1日量6個(成人)中に次の成分を含有する黄緑色半透明のフィルム状トローチ剤です。

成分	6個中の含量	働き
セチルピリジニウム塩化物水和物	6mg	口腔内を殺菌・消毒し、口臭を除去します。
クlorフェニラミンマレイン酸塩	6mg	炎症をしずめ、のどの痛み・はれを改善します。
グリチルリチン酸二カリウム	15mg	

添加物としてヒドロキシプロピルセルロース、ポビドン、プルラン、マクロゴール、*l*-メントール、タンニン酸、D-ソルビトール、サッカリンNa、ショ糖脂肪酸エステル、銅クロロフィリンNa、バニリン、エチルバニリン、香料を含有します。

保管及び取扱い上の注意

- (1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2)小児の手の届かない所に保管してください。
- (3)他の容器に入れ替えないでください。
(誤用の原因になったり品質が変わります。)
- (4)薬剤入りアルミ包装開封後はすみやかに使用してください。
- (5)使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。
使用期限は外箱に記載しています。



包装

18個入

お問い合わせ先

お問い合わせはお買い求めのお店又は下記までご連絡いただきますようお願い申し上げます。

連絡先 大鵬薬品工業株式会社 お客様相談室

〒101-8444 東京都千代田区神田錦町1-27

電話番号：03-3293-4509 受付時間：9:00~17:30(土、日、祝日を除く)