

この添付文書は、お薬とともに保管し、  
服用の際には、必ずお読み下さい。

【漢方薬】

# フラーリン® A錠

第2類医薬品

- ◆ フラーリンA錠は、万病回春<sup>まんびょうかいしゅん</sup>という書物に書かれている処方をもとにした漢方薬の錠剤です。体力中等度で、水様性の下痢・嘔吐・口渇・尿量減少を伴う方の、食あたり・冷え腹・腹痛などの症状を改善します。

## ⚠ 使用上の注意



### 相談すること

- 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
  - 医師の治療を受けている人。
  - 妊婦又は妊娠していると思われる人。
  - 高齢者。
  - 今までに薬などにより発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人。
- 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

関係部位	症 状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ

- 1ヵ月位(急性胃腸炎に服用する場合には5～6回、食あたり、暑気あたりに服用する場合には5～6日間)服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
- 他の医薬品等を併用する場合には、含有成分の重複に注意する必要があるため、医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

## 効能・効果

体力中等度で、水様性の下痢、嘔吐があり、口渇<sup>a)</sup>、尿量減少を伴うものの次の諸症：  
食あたり、暑気あたり、冷え腹、急性胃腸炎、腹痛

a)口渇：口のかわきのことを示します。

## 用法・用量

次の量を食間<sup>注)</sup>に、コップ半分以上のぬるま湯にて服用して下さい。

注)「食間」とは食後2～3時間を指します。

年 齢	1 回量	1 日服用回数
成人(15歳以上)	6 錠	3 回
15歳未満7歳以上	4 錠	
7歳未満5歳以上	3 錠	
5歳未満	服用しないこと	

〈用法・用量に関連する注意〉

- 用法・用量を厳守すること。
- 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させること。

## 成分・分量

本剤18錠(3.6g)中

カンゾウ	0.30g	タクシヤ	0.75g	} 胃茶湯エキス……0.608g
ケイヒ	0.60g	チヨレイ	0.75g	
コウボク	0.75g	チンピ	0.75g	
シヨウキヨウ	0.45g	ビヤクジュツ	0.75g	
ソウジュツ	0.75g	ブクリヨウ	0.75g	
タイソウ	0.45g			
カンゾウ末	0.051g	タクシヤ末	0.128g	
ケイヒ末	0.102g	チヨレイ末	0.128g	
コウボク末	0.128g	チンピ末	0.128g	
シヨウキヨウ末	0.077g	ビヤクジュツ末	0.128g	
ソウジュツ末	0.128g	ブクリヨウ末	0.128g	
タイソウ末	0.077g			

添加物としてカルメロースカルシウム、軽質無水ケイ酸、ステアリン酸マグネシウム、デキストリン、トモロコシデンブンを含有する。

- ・本剤は黄褐色で、特異なおいを有し、味は甘く後わずかに苦い錠剤です。
- ・本剤は天然の生薬を原料としていますので、多少色調の異なることがあります、効果に変わりはありません。

## 保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管すること。
- (2) 小児の手の届かない所に保管すること。
- (3) 他の容器に入れ替えないこと。(誤用の原因になったり品質が変わる。)
- (4) 分包品において1包を分割した残りを服用する場合には、袋の口を折り返して保管し、2日以内に服用すること。

フラーリンA錠は生薬の特性を活かした漢方薬ですので、あなたの体質や病状を考えて正しく服用することが大切です。

あなたの病気を早く治すため、お薬の服用に際しては、漢方薬のことをご理解いただいている医師、薬局・薬店の先生方とよくご相談下さい。

### お問い合わせ先

本製品についてのお問い合わせは、お買い求めのお店、又は下記にお願いします。

剂盛堂薬品株式会社 学術部

電話 073(472)3111(代表)

受付時間 9:00~12:00 13:00~17:00

(土、日、祝日を除く)

製造販売元

剂盛堂薬品株式会社

〒640-8323 和歌山市太田二丁目8番31号