

漢方製剤

第2類医薬品

いんちんこうとう
茵陳蒿湯エキス〔細粒〕1

本方は上腹部が張り、つまったような不快感があり、また、のどがかわく、尿量が少なく色が濃い、便秘などがあるものを目標とします。

 ● 使用上の注意 ●

 **してはいけないこと**

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)

1. 次の方は服用しないでください。
生後3ヵ月未満の乳児
2. 本剤を服用している間は、次の医薬品を服用しないでください。
他の瀉下薬（下剤）
3. 授乳中の方は本剤を服用しないか、本剤を服用する場合は授乳を避けてください。



相談すること

1. 次の方は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
(1)医師の治療を受けている人
(2)妊婦又は妊娠していると思われる人
(3)体の虚弱な人（体力の衰えている人、体の弱い人）
(4)胃腸が弱く下痢しやすい人
2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性がありますので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関係部位	症 状
消化器	吐き気・嘔吐、食欲不振、胃部不快感、はげしい腹痛を伴う下痢、腹痛

まれに下記のような重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症 状
肝機能障害	発熱、かゆみ、発疹、黄疸（皮膚や白目が黄色くなる）、褐色尿、全身のだるさ、食欲不振等があらわれる。
腸間膜静脈硬化症	長期服用により、腹痛、下痢、便秘、腹部膨満等が繰り返しあらわれる。

3. 服用後、次の症状があらわれることがありますので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

下痢

4. 1週間位服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

*5. 長期連用する場合には、医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

●効能・効果●

体力中等度以上で、口渇があり、尿量少なく、便秘するものの次の諸症：

じんましん、口内炎、湿疹・皮膚炎、皮膚のかゆみ

●用法・用量●

次の量を食前又は食間に水又は温湯で服用してください。

(食間とは食後2～3時間を指します。)

年 齢	1 回 量		1日服用回数
	分包剤	大入り剤	
大人(15才以上)	1 包	2.0 g	3 回
15才未満7才以上	2/3包	1.3 g	
7才未満4才以上	1/2包	1.0 g	
4才未満2才以上	1/3包	0.7 g	
2才未満	1/4包	0.5 g以下	

〔用法・用量に関連する注意〕

(1)用法・用量を厳守してください。

(2)小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。

(3)1才未満の乳児には、医師の診療を受けさせることを優先し、やむを得ない場合にのみ服用させてください。

●成分・分量●

本品3包(6.0g)又は6.0gは

〔インチンコウ……………2.0g ダイオウ ……………0.5g〕
〔サンシシ……………1.5g〕

上記より製した茵陳蒿湯水製エキス2.1g(乾燥物換算で約0.75gに相当)を含有する細粒剤です。添加物としてメタケイ酸アルミン酸Mg、乳糖、バレイショデンプン、香料を含有します。

●保管及び取扱い上の注意●

(1)直射日光の当たらない、湿気の少ない涼しい所に保管してください。

(2)小児の手の届かない所に保管してください。

(3)他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり、品質が変わることがあります。)

(4)本剤は天然物を成分としていますので、製品により若干色調が異なることがありますが、効果には変わりありません。

(5)分包剤で1包を分割した残りを使用する場合には、袋の口を折り返して保管し、2日以内に使用してください。

(6)使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。

●お問い合わせ先●

松浦薬業株式会社 お客様相談窓口

TEL (052)883-5172 受付時間 10:00～17:00(土・日・祝日を除く)

製造販売元

 **松浦薬業株式会社**
名古屋市昭和区円上町24-21