



第一三共ヘルスケア

ひきはじめのかぜに

カコナール[®]

体力中等度以上の方の

感冒の初期

鼻かぜ

頭痛

眠くなる成分を含まない

1日分 30mL×3本



第2類医薬品

第2類医薬品

カコナール[®]



お問い合わせ先

第一三共ヘルスケア(株)
お客様相談室
電話 0120-337-336
受付時間 9:00~17:00
(土、日、祝日を除く)

<https://www.daiichisankyo-hc.co.jp/>

販売元
第一三共ヘルスケア株式会社
東京都中央区日本橋3-14-10
製造販売元
新生薬品工業株式会社
奈良県高市郡高取町清水谷1269

開封口

使用前にこの箱の説明文書を必ずお読み下さい。
また、必要な時に読めるよう大切に保管して下さい。

使用上の注意 相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。(1) 医師の治療を受けている人 (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人 (3) 体の虚弱な人(体力の衰えている人、体の弱い人) (4) 胃腸の弱い人 (5) 発汗傾向の著しい人 (6) 高齢者 (7) 今までに薬などにより発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人 (8) 次の症状のある人: むくみ、排尿困難 (9) 次の診断を受けた人: 高血圧、心臓病、腎臓病、甲状腺機能障害
2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性がありますので、直ちに服用を中止し、この外箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消化 器	吐き気、食欲不振、胃部不快感

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けて下さい。

症状の名称	症 状
偽アルドステロン症、ミオパチー	手足のだるさ、しびれ、つっぱり感やこわばりに加えて、脱力感、筋肉痛があらわれ、徐々に強くなる。
肝機能障害	発熱、かゆみ、発疹、黄疸(皮膚や白目が黄色くなる)、褐色尿、全身のだるさ、食欲不振等があらわれる。

3.1カ月位(感冒の初期、鼻かぜ、頭痛に服用する場合には5~6回)服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この外箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。

4. 長期連用する場合には、医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。

カコナール
30mL×3本

第2類医薬品

水製抽出液葛根湯

[効能・効果]

体力中等度以上のものの次の諸症
感冒の初期(汗をかいていないもの)、鼻かぜ、鼻炎、頭痛、肩こり、筋肉痛、手や肩の痛み

[用法・用量]

次の量を食間に服用して下さい。

年 齢	1回量	1日服用回数
成人(15歳以上)	1本	3回
15歳未満	服用しないで下さい。	

食間とは食事と食事の間で、前の食事から2~3時間後のことです。

[用法・用量に関する注意]

(1) 用法・用量を厳守して下さい。 (2) 本剤は1回1本飲みきりです。 (3) 本剤は本質的に沈殿を含んでいます。よく振ってから服用して下さい。

[成分・分量] 90mL(30mL×3本) 中

葛根湯抽出液(下記生葉の水製抽出液)…90mL
 [日局 カッコン…8g 日局 マオウ…4g]
 [日局 タイソウ…4g 日局 ケイヒ…3g]
 [日局 シャクヤク…3g 日局 カンゾウ…2g]
 [日局 ショウキョウ…1g]

添加物:D-ソルビトール、白糖、安息香酸Na、パラベン、香料、プロピレンジコール、エタノール

[保管及び取扱い上の注意]

(1) 直射日光の当たらない涼しい所に保管して下さい。(2) 小児の手の届かない所に保管して下さい。(3) 他の容器に入れ替えないで下さい。(誤用の原因になったり品質が変わります) (4) 表示の使用期限を過ぎた製品は使用しないで下さい。