

この説明文書はお薬とともに保管し、ご使用の際には必ずお読みください。

比較的体力がある方の
鼻づまり・蓄膿症・慢性鼻炎に
漢方薬

第2類医薬品

フジビートル[®]B錠

製品の特徴

フジビートルB錠は、漢方処方の「葛根湯加川芎辛夷」かつこんとうかせんきゅうしんいをエキス化し、服用しやすい錠剤にした製品です。

「葛根湯加川芎辛夷」は、「葛根湯」に川芎と辛夷を加え、比較的体力がある方の、鼻づまりや蓄膿症、慢性鼻炎の改善に使用できるように処方されています。



相談すること



使用上の注意

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

- (1) 医師の治療を受けている人。
- (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
- (3) 体の虚弱な人(体力の衰えている人、体の弱い人)。
- (4) 胃腸の弱い人。
- (5) 発汗傾向の著しい人。
- (6) 高齢者。
- (7) 今までに薬などにより発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人。
- (8) 次の症状のある人。
むくみ、排尿困難
- (9) 次の診断を受けた人。
高血圧、心臓病、腎臓病、甲状腺機能障害

2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性がありますので、直ちに服用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	吐き気、食欲不振、胃部不快感

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診察を受けてください。

症状の名称	症 状
偽アルドステロン症、 ミオパチー	手足のだるさ、しびれ、つばり感やこわばりに加えて、 脱力感、筋肉痛があらわれ、徐々に強くなる。

3. 1ヵ月位服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
4. 長期連用する場合には、医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

効能・効果

比較的体力があるものの次の諸症:

鼻づまり、蓄膿症(副鼻腔炎)、慢性鼻炎

用法・用量

1回下記量を食前又は食間に水又はお湯と一緒に服用してください。

年 齢	1 回 量	1日服用回数
大人(15才以上)	6錠	3回
7才以上15才未満	4錠	
5才以上7才未満	3錠	
5才未満	服用させないでください	

食間とは、「食事と食事の間」という意味です。食事のあと2時間ぐらいたったところで服用してください。

<用法・用量に関する注意>

(1) 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。

成分・分量(18錠中)

葛根湯加川芎辛夷乾燥エキス……………4,200mg

カクコン……………4g	マ オ ウ……………4g	タイソウ……………3g
センキュウ……………3g	ケ イ ヒ……………2g	シャクヤク……………2g
カンゾウ……………2g	ショウキョウ……………1g	シ ン イ……………3g

添加物として、ヒドロキシプロピルセルロース、無水ケイ酸、マクロゴール、カルメロースCa、ステアリン酸Mgを含有します。

保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わります。)
- (4) 使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。
- (5) 本剤は、生薬を用いた製剤ですので、製品により色が多少異なることがありますが、効果に変わりはありません。
- (6) ビンの詰め物は、輸送中の内容物の破損を防ぐためのものです。開封後は不要となりますので、取りのぞいてください。

お問い合わせ先

本剤についてのお問い合わせは、お買い求めの販売店又は下記までご連絡をいただきますようお願い申し上げます。

湧永製薬株式会社 お客様相談室

☎ 0570-666-170

受付時間 9時～12時、13時～17時(土、日、祝日を除く)



販売元

湧永製薬株式会社

広島県安芸高田市甲田町下甲1624
本社：大阪市淀川区宮原4丁目5-36
<http://www.wakunaga.co.jp/>

製造販売元

国産薬品工業株式会社

岐阜市秋沢370番2