

服用に際しては、この説明文書を必ずお読みください。
また、必要な時に読めるよう大切に保存してください。

しょう かく とう

松 鶴 湯 A

（漢方製剤）



使用上の注意



してはいけないこと

（守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる）

次の人は服用しないこと

生後3カ月未満の乳児。



相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
 - （1）医師の治療を受けている人。
 - （2）妊婦又は妊娠していると思われる人。
 - （3）今までに薬などにより発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人。
2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ

*まれに下記の重篤な症状が起こることがある。その場合は直ちに医師の診療を受けること。

症状の名称	症 状
腸間膜静脈硬化症	長期服用により、腹痛、下痢、便秘、腹部膨満等が繰り返しあらわれる。

3. 1ヵ月位服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
- *4. 長期連用する場合には、医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

効能・効果

体力中等度以下で、心身が疲れ、血色が悪く、ときに熱感を伴うものの次の諸症：
貧血、不眠症、精神不安、神経症

用法・用量

本品 1 包を煎じる容器（鉄製のものは使用しない）に入れ、水 550mL（約 3 合）を加えて火に掛け、沸騰したら弱火にし、ふきこぼれないように気をつけながら約半量となるまで煎じ、成人 1 日量とし食間に服用します。

年 齢	1 回 量	1 日服用回数
成 人	1 日分の 1/3 量	3 回
7 歳以上 15 歳未満	成人の 2/3 量	
4 歳以上 7 歳未満	成人の 1/2 量	
2 歳以上 4 歳未満	成人の 1/3 量	
2 歳未満	成人の 1/4 量	

食間とは…
食後 2～3 時間を
指します。

〈用法・用量に関連する注意〉

- （1）服用に際しては、人肌程度に温めて服用すること。
- （2）小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させること。
- （3）1 歳未満の乳児には、医師の診療を受けさせることを優先し、止むを得ない場合にのみ服用させること。

成分・分量

本品 1 包（26.8g）中、下記生薬を含有します。

ニ ン シ ン	-----	2.4g	ビ ャ ク シ ュ ツ	-----	2.4g
ブ ク リ ョ ウ	-----	2.4g	サ ン ソ ウ ニ ン	-----	2.4g
リ ュ ウ ガ ン ニ ク	-----	2.4g	オ ウ ギ	-----	2.4g
ト ウ キ	-----	1.6g	オ ン シ	-----	1.6g
サ イ コ	-----	2.4g	サ ン シ シ	-----	1.6g
カ ン ソ ウ	-----	0.8g	モ ッ コ ウ	-----	0.8g
タ イ ソ ウ	-----	1.6g	シ ョ ウ キ ョ ウ	-----	0.4g
ポ タ ン ビ	-----	1.6g			

添加物は含有していません。

〈成分・分量に関連する注意〉

- （1）本剤の服用により、糖尿病の検査値に影響を及ぼすことがあります。
- （2）本剤は、生薬を原料として製造しておりますので、製品の色や味等に多少の差異が生ずることがありますが、品質には変わりありません。

保管及び取扱い上の注意

- （1）直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- （2）小児の手の届かない所に保管してください。
- （3）煎じた薬液は、冷蔵庫に保管してなるべく早めに服用してください。
- （4）使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。使用期限は外箱に記載しています。

お問い合わせ先

株式会社 建林松鶴堂 お客様相談室
電 話 03-3843-3833
受付時間 9時から17時まで（土、日、祭日を除く）

製造販売元 たてばやししょうかくどう
株式会社 **建林松鶴堂**
〒335-0024 埼玉県戸田市戸田公園 3-7