

ご使用に際しては、この添付文書を必ずお読み下さい。また、必要な時に読めるよう大切に保管して下さい。

第2類医薬品

ウチダの漢方製剤

ウチダの **明華順心**

メイカジュンシン

20

分包

ウチダの明華順心は、漢方処方にしたがい生薬を配合し抽出して得た水製エキスを用いた使いやすい細粒の分包にしたものです。



使用上の注意



相談すること

- 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
  - 医師の治療を受けている人。
  - 妊婦又は妊娠していると思われる人。
  - 胃腸の弱い人。
  - 高齢者。
  - 今までに薬等により発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人。
  - 次の症状のある人。
    - むくみ
  - 次の診断を受けた人。
    - 高血圧、心臓病、腎臓病

- 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

| 関係部位 | 症状                |
|------|-------------------|
| 皮膚   | 発疹・発赤、かゆみ         |
| 消化器  | 吐き気・嘔吐、食欲不振、胃部不快感 |

まれに下記の重篤な症状が起こることがある。その場合は直ちに医師の診療を受けること。

| 症状の名称           | 症状  |
|-----------------|---|
| 偽アルドステロン症、ミオパチー | 手足のだるさ、しびれ、つっぱり感やこわばりに加えて、脱力感、筋肉痛があらわれ、徐々に強くなる。   |
| 肝機能障害           | 発熱、かゆみ、発疹、黄疸（皮膚や白目が黄色くなる）、褐色尿、全身のだるさ、食欲不振等があらわれる。 |
| *腸間膜静脈硬化症       | 長期服用により、腹痛、下痢、便秘、腹部膨満等が繰り返しあらわれる。                 |

- 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
  - 下痢
- 1ヵ月位服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
- 長期連用する場合には、医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

効能・効果

体力中等度以下で、のぼせ感があり、肩がこり、疲れやすく、精神不安やいらだちなどの精神神経症状、ときに便秘の傾向のあるものの次の諸症：  
冷え症、虚弱体質、月経不順、月経困難、更年期障害、血の道症<sup>注</sup>、不眠症

効能・効果に関連する注意

注)「<sup>ちのみちしんじょう</sup>血の道症」とは、月経、妊娠、出産、産後、更年期など女性のホルモンの変動に伴って現れる精神不安やいらだちなどの精神神経症状および身体症状のことである。

用法・用量

次の1回量を1日3回食前または食間に服用する。

| 年齢        | 1回量     |
|-----------|---------|
| 大人(15歳以上) | 1包      |
| 15歳未満7歳以上 | 2/3包    |
| 7歳未満      | 服用しないこと |

用法・用量に関連する注意

小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させること。

成分・分量

本品1日量〔3包(1包2g)〕中

- トウキ……………1.5g
- シャクヤク……………1.5g
- ビャクジュツ……………1.5g
- ブクリョウ……………1.5g
- サイコ……………1.5g
- ポタンピ……………1.0g
- サンシシ……………1.0g
- カンゾウ……………1.0g
- ショウキョウ……………0.5g
- ハッカ……………0.5g

加味逍遙散料エキス……………2.60g

賦形剤として乳糖水和物・パレイシヨテンブン、吸湿防止剤としてメタケイ酸アルミン酸Mgを含有する。

保管及び取扱い上の注意

- 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管すること。
- 小児の手の届かない所に保管すること。
- 他の容器に入れ替えないこと。(誤用の原因になったり品質が変わる。)
- 小児で1包を分割した残りを服用する場合には、袋の口を折り曲げて保管し、2日以内に服用すること。

お問い合わせ先

本品の内容についてのお問い合わせは、お買い求めのお店または下記にお願い申し上げます。

株式会社ウチダ和漢薬 お客様相談センター

TEL 03-3806-4141

受付時間 9:00~17:30(土、日、祝日を除く)

本剤は生薬を原料としていますので、製品により多少色が異なることがあります。効能・効果にかわりはありません。



株式会社 ウチダ和漢薬

東京都荒川区東日暮里 4-3-4