

この添付文書は本剤とともに保管し、服用の際には、よくお読みください。

漢方製剤

第2類医薬品

かみしょうようさん 加味逍遙散エキス [細粒] 8

本方は、体力中等度以下で、疲れやすく、情緒不安定な傾向があり、肩こり、便秘などの症状が見られる人の月経不順や更年期障害などに用いられます。



● 使用上の注意 ●



してはいけないこと*

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなります)

次の人は服用しないでください。

生後3ヵ月未満の乳児



相談すること

1. 次の人は服用前に医師又は薬剤師に相談してください。

- (1) 医師の治療を受けている人
- (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人
- (3) 胃腸の弱い人
- (4) 高齢者
- (5) 今までに薬により発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人
- (6) 次の症状のある人
むくみ
- (7) 次の診断を受けた人
高血圧、心臓病、腎臓病

2. 次の場合は、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師又は薬剤師に相談してください。

(1) 服用後、次の症状があらわれた場合

| 関係部位 | 症 状 |
|------|------------------|
| 皮 膚 | 発疹・発赤、かゆみ |
| 消化器 | 悪心・嘔吐、食欲不振、胃部不快感 |

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

| 症状の名称 | 症 状 |
|-----------|---|
| 偽アルドステロン症 | 尿量が減少する、顔や手足がむくむ、まぶたが重くなる、手がこわばる、血圧が高くなる、頭痛等があらわれる。 |
| 肝機能障害 | 全身のだるさ、黄疸（皮膚や白目が黄色くなる）等があらわれる。 |

(2) 1ヵ月位服用しても症状がよくなる場合

3. 長期連用する場合には、医師又は薬剤師に相談してください。

4. 次の症状があらわれることがありますので、このような症状の継続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、医師又は薬剤師に相談してください。

下痢

(裏面につづく)

* ● 効能・効果 ●

体力中等度以下で、のぼせ感があり、肩がこり、疲れやすく、精神不安やいらだちなどの精神神経症状、ときに便秘の傾向のあるものの次の諸症：

冷え症、虚弱体質、月経不順、月経困難、更年期障害、血の道症^{注)}、不眠症

注) 血の道症とは、月経、妊娠、出産、産後、更年期など女性のホルモンの変動に伴って現れる精神不安やいらだちなどの精神神経症状および身体症状のことです。

* ● 用法・用量 ●

次の量を1日3回、食前又は食間に服用してください。
(食間とは食後2～3時間を指します。)

| 年 齢 | 1 回 量 | |
|-----------|-------|---------|
| | 分包剤 | 大入り剤 |
| 大人(15才以上) | 1 包 | 2.0 g |
| 15才未満7才以上 | 2/3包 | 1.3 g |
| 7才未満4才以上 | 1/2包 | 1.0 g |
| 4才未満2才以上 | 1/3包 | 0.7 g |
| 2才未満 | 1/4包 | 0.5 g以下 |

〔用法・用量に関連する注意〕

- (1)用法・用量を厳守してください。
- (2)小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。
- (3)1才未満の乳児には、医師の診療を受けさせることを優先し、止むを得ない場合にのみ服用させてください。

● 成分・分量 ●

本品3包(6.0g)又は6.0gは

| | |
|------------------|------------------|
| トウキ……………1.5 g | ポタンピ……………1.0 g |
| シャクヤク……………1.5 g | サンシシ……………1.0 g |
| ピャクジュツ……………1.5 g | カンゾウ……………1.0 g |
| プクリョウ……………1.5 g | ショウキョウ……………0.5 g |
| サイコ……………1.5 g | ハッカ……………0.5 g |

上記より製した加味逍遙散エキス(1/2量)4.6gを含有する細粒剤です。添加物としてメタケイ酸アルミン酸Mg、ヒプロメロース、乳糖、トウモロコシデンプン、香料を含有します。

● 保管及び取扱い上の注意 ●

- (1)直射日光の当たらない、湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2)小児の手の届かない所に保管してください。
- (3)他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり、品質が変わることがあります。)
- (4)本剤は天然物を成分としていますので、製品により若干色調が異なることがあります。効果には変わりありません。
- (5)分包剤で1包を分割した残りを使用する場合には、袋の口を折り返して保管し、2日以内に使用してください。
- (6)使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。

● お問い合わせ先 ●

松浦漢方株式会社 薬事学術部

TEL (052)883-5131 受付時間 10:00～17:00 (土・日・祝日を除く)

発 売 元

製造販売元

松浦漢方株式会社

 **松浦漢方株式会社**

名古屋市昭和区円上町24-21

名古屋市緑区大高町寅新田36