

●成分・分量 ●本品6.0gは
 トウキ……………1.5g ボタンピ……………1.0g
 シャクヤク……………1.5g サンシシ……………1.0g
 ヒャクジュツ……………1.5g カンゾウ……………1.0g
 プクリョウ……………1.5g ショウキョウ……………0.5g
 サイコ……………1.5g ハツカ……………0.5g

上記より製した加味逍遙散エキス(1/2量)4.6g(乾燥物換算で約2.3gに相当)を含有する細粒剤です。添加物としてメタケイ酸アルミン酸Mg、ヒプロメロース、乳糖、トウモロコシデンプン、香料を含有します。

●効能・効果 ●
 体力中等度以下で、のぼせ感があり、肩がこり、疲れやすく、精神不安やいらだちなどの精神神経症状、ときに便秘の傾向のあるもの次の諸症：
 冷え症、虚弱体質、月経不順、月経困難、更年期障害、血の道症、不眠症
 [効能・効果に関連する注意]
 血の道症とは、月経、妊娠、出産、産後、更年期など女性のホルモンの変動に伴って現れる精神不安やいらだちなどの精神神経症状および身体症状のことです。



●用法・用量 ●
 大人(15才以上) 1回 2.0g
 15才未満7才以上 1回 1.3g
 7才未満4才以上 1回 1.0g
 4才未満2才以上 1回 0.7g
 2才未満 1回 0.5g以下

1日3回、食前又は食間に服用してください。用時添付のサジを使用してください。(サジ一杯は0.5gです。)

[用法・用量に関連する注意]
 (1)用法・用量を厳守してください。
 (2)小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。
 (3)1才未満の乳児には、医師の診療を受けさせることを優先し、やむを得ない場合にのみ服用させてください。

[副作用被害救済制度]
 ☎0120-149-931

ボトル、キャップ
 中栓、外装フィルム **500g**

製造販売元
 松浦薬業株式会社
 名古屋市中区大野上町24-21

漢方専門 一 心 堂 薬 局

か み しょう よう さん 加味逍遙散エキス 〔細粒〕8

第2類医薬品



発 売 元
一 心 堂 漢 方 株 式 会 社

埼玉県さいたま市大宮区高鼻町1-80アコルト大野1階
 TEL 048-648-2014

●使用上の注意●

【してはいけないこと】(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)
 次の人は服用しないでください。 生後3ヵ月未満の乳児

相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
 (1) 医師の治療を受けている人 (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人 (3) 胃腸の弱い人 (4) 高齢者 (5) 今までに薬などにより発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人 (6) むくみのある人 (7) 高血圧、心臓病、腎臓病の診断を受けた人
2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性がありますので、直ちに服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	吐き気、嘔吐、食欲不振、胃部不快感

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症 状
偽アルドステロン症、ミオパチー	手足のだるさ、しびれ、つばり感やこわばりに加えて、脱力感、筋肉痛があらわれ、徐々に強くなる。
肝機能障害	発熱、かゆみ、発疹、黄疸(皮膚や白目が黄色くなる)、褐色尿、全身のだるさ、食欲不振等があらわれる。
腸間膜静脈硬化症	長期服用により、腹痛、下痢、便秘、腹部膨満等が繰り返しあらわれる。

3. 服用後、次の症状があらわれることがありますので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。 下痢
4. 1ヵ月位服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
5. 長期連用する場合には、医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

●保管及び取扱い上の注意●

- (1) 直射日光の当たらない、湿気の少ない涼しい所に密栓して保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり、品質が変わることがあります。)
- (4) 本剤は天然物を成分としていますので、製品により若干色調が異なることがあります。が、効果には変わりありません。