

第2類医薬品



漢方煎専科

荊芥連翹湯

50

5日分10包



自然のちから、ひとに活かして
株式会社 アキザワ漢方廠

漢方薬 荊芥連翹湯 「タキザワ」

第2類医薬品

17F

△＜使用上の注意＞

⊗ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります。)

次の人は服用しないでください。
生後3ヵ月未満の乳児



相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

- (1) 医師の治療を受けている人
- (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人
- (3) 胃腸が弱く下痢しやすい人
- (4) 高齢者
- (5) 次の症状のある人
むくみ
- (6) 次の診断を受けた人
高血圧、心臓病、腎臓病

2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この袋を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関係部位	症 状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	食欲不振、胃部不快感

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診察を受けてください。

症状の名称	症 状
間質性肺炎	階段を上ったり、少し無理をしたりすると息切れがする・息苦しくなる、空せき、発熱等がみられ、これらが急にあらわれたり、持続したりする。
偽アルドステロン症、ミオパチー	手足のだるさ、しびれ、つっぱり感やこばりに加えて、脱力感、筋肉痛があらわれ、徐々に強くなる。
肝機能障害	発熱、かゆみ、発疹、黄疸（皮膚や白目が黄色くなる）、褐色尿、全身のだるさ、食欲不振等があらわれる。

3. 1ヵ月位服用しても症状がよくなる場合
は服用を中止し、この袋を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

4. 長期連用する場合には、医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

【成分・分量】

トクシャクキ	1.5g	ケボ	1.5g	イガフ	1.5g
シヤンキョウ	1.5g	ハハ	1.5g	ウツカ	1.5g
セキオ	1.5g	ウツ	1.5g	カ	1.5g
オウゴン	1.5g	カ	1.5g	ソク	1.5g
オウゴン	1.5g	カ	1.5g	シ	2.5g
オウゴン	1.5g	カ	1.5g	シ	2.5g
オウゴン	1.5g	カ	1.5g	シ	2.5g
レンギョウ	1.5g	カ	1.5g	シ	2.5g
		1日分	(1包14.25g×2) 28.5g		

【効能・効果】

体力中等度以上で、皮膚の色が浅黒く、ときに手足の裏に脂汗をかきやすく腹壁が緊張しているものの次の諸症：蓄膿症(副鼻腔炎)、慢性鼻炎、慢性扁桃炎、にきび

【用法・用量】

◎大人及び15歳未満7歳以上の場合

本品2包(1日分)を和紙袋入りのまま、水約600mLを加えて半量ぐらいまで煎じつめ、和紙袋とともに煎じかすを除き、煎液を2回に分けて、朝夕の空腹時に服用してください。

年 齢	大人(15歳以上)	15歳未満7歳以上
1回量	煎液の1/2	煎液の1/3

又は1日2回朝夕の空腹時に、本品1包(1回分)を和紙袋入りのまま、水約300mLを加えて上記と同様に製し服用してください。

年 齢	大人(15歳以上)	15歳未満7歳以上
1回量	煎液全部	煎液の2/3

◎7歳未満の場合

本品1包を和紙袋入りのまま、水約300mLを加えて上記と同様に製して、煎液を2回に分けて、朝夕の空腹時に服用してください。

年 齢	7歳未満4歳以上	4歳未満2歳以上	2歳未満
1回量	煎液の1/2	煎液の1/3	煎液の1/4以下

＜用法・用量に関連する注意＞

- (1) 用法・用量を厳守してください。
- (2) 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。
- (3) 1歳未満の乳児には、医師の診察を受けさせることを優先し、やむを得ない場合にのみ服用させてください。

【保管及び取扱い上の注意】

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。
(誤用の原因になったり品質が変わることがあります。)



4 974961 180056



製造販売元
株式会社 タキザワ漢方廠
さいたま市大宮区堀の内町2丁目623-1
お客様相談室 ☎048-688-7923
受付時間：9時～18時(月～金)

タキザワ漢方



ホームページ:takizawa.asia

副作用被害救済制度の問合せ先
(独) 医薬品医療機器総合機構
http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai_camp/index.html
☎0120-149-931

