

タキザワの

漢方煎薬

第2類医薬品

5日分10包  
82

桂枝人参湯「タキザワ」



株式会社タキザワ漢方廠

## 漢方薬 桂枝人参湯 「タキザワ」

15L

## △&lt;使用上の注意&gt;

## ❌ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります。)

次の人は服用しないでください。

生後3ヵ月未満の乳児



## 相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

- (1) 医師の治療を受けている人
- (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人
- (3) 高齢者
- (4) 今までに薬などにより発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人
- (5) 次の症状のある人  
むくみ
- (6) 次の診断を受けた人  
高血圧、心臓病、腎臓病

2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この袋を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関係部位	症 状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診察を受けてください。

症状の名称	症 状
偽アルドステロン症、ミオパチー	手足のだるさ、しびれ、つっぱり感やこわばりに加えて、脱力感、筋肉痛があらわれ、徐々に強くなる。

3. 1ヵ月位(頭痛、動悸、消化器症状を伴う感冒に服用する場合には1週間位)服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この袋を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

4. 長期運用する場合には、医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

## 【成分・分量】

ケイヒ……………4.0g カンゾウ……………3.0g  
ニンジン……………3.0g ショウキョウ……………2.0g  
ソウジュツ……………3.0g  
1日分(1包7.5g×2) 15.0g

## 【効能・効果】

体力虚弱で、胃腸が弱く、ときに発熱・悪寒を伴うものの次の諸症：頭痛、動悸、慢性胃腸炎、胃腸虚弱、下痢、消化器症状を伴う感冒

## 【用法・用量】

1日2回朝夕の空腹時に、本品1包(1回分)を和紙袋入りのまま、水約300mLを加えて半量くらいまで煎じつめ、和紙袋とともに煎じかすを除き、次の量を服用してください。

年 齢	1回量
大人(15歳以上)	全量
15歳未満7歳以上	大人の2/3
7歳未満4歳以上	大人の1/2
4歳未満2歳以上	大人の1/3
2歳未満	大人の1/4以下

## &lt;用法・用量に関連する注意&gt;

- (1) 用法・用量を厳守してください。
- (2) 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。
- (3) 1歳未満の乳児には、医師の診察を受けさせることを優先し、止むを得ない場合にのみ服用させてください。

## 【保管及び取扱い上の注意】

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わることがあります。)



4 974961 110138



製造販売元

株式会社 タキザワ漢方薬

さいたま市見沼区片柳412-1

お客様相談室 ☎045-688-7923

受付時間：9時～18時(月～金)

タキザワ漢方

検索

ホームページ:takizawa.asia

副作用被害救済制度の問合せ先

(独)医薬品医療機器総合機構

http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai.html

☎0120-149-931

アルミ袋  
梱包装