



第2類医薬品

漢方煎専科

牛車腎気丸料

107

5日分15包



自然のちから、ひとに活かして  
株式会社 タキザワ漢方廠



# 漢方薬 牛車腎気丸料「タキザワ」

16E

## △＜使用上の注意＞



### 相談すること

- 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
  - 医師の治療を受けている人
  - 妊婦又は妊娠していると思われる人
  - 胃腸が弱く下痢しやすい人
  - のぼせが強く赤ら顔で体力の充実している人
  - 今までに薬などにより発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人
- 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この袋を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関係部位	症 状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	食欲不振、胃部不快感、腹痛
その他	動悸、のぼせ、口唇・舌のしびれ(*)

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症 状
間質性肺炎	階段を上ったり、少し無理をしたりすると息切れがする・息苦しくなる、空せき、発熱等がみられ、これらが急にあらわれたり、持続したりする。
肝機能障害	発熱、かゆみ、発疹、黄疸（皮膚や白目が黄色くなる）、褐色尿、全身のだるさ、食欲不振等があらわれる。

- 服用後、次の症状があらわれることがありますので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この袋を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。  
下痢
- 1ヵ月位服用しても症状がよくなる場合  
は服用を中止し、この袋を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

### 【成分・分量】

ジ オ ウ……………6.0g	ポ タ ン ビ……………3.0g
サンシュユ……………3.0g	ケ イ ヒ……………1.0g
サンヤク……………3.0g	ブ シ……………0.5g
タクシャ……………3.0g	ゴ シ ツ……………3.0g
ブクリョウ……………3.0g	シャゼンシ……………3.0g
1日分（1包9.5g×3）28.5g	

### 【効能・効果】

体力中等度以下で、疲れやすくて、四肢が冷えやすく尿量減少し、むくみがあり、ときに口渴があるもの。次の諸症：下肢痛、腰痛、しびれ、高齢者のかすみ目、かゆみ、排尿困難、頻尿、むくみ、高血圧に伴う随伴症状の改善（肩こり、頭重、耳鳴り）

### 【用法・用量】

1日3回朝昼夕の空腹時に、本品1包（1回分）を和紙袋入りのまま、水約200mLを加えて半量くらいまで煎じつめ、和紙袋とともに煎じかすを除き、次の量を服用してください。

年 齢	1回量
大人(15歳以上)	全量
15歳未満	服用しないこと

※用法・用量を厳守してください。

### 【保管及び取扱い上の注意】

- 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- 小児の手の届かない所に保管してください。
- 他の容器に入れ替えないでください。  
(誤用の原因になったり品質が変わることがあります。)



製造販売元  
株式会社 **タキザワ漢方薬**  
さいたま市大宮区堀の内町2丁目623-1  
お客様相談室 ☎048-688-7923  
受付時間：9時～18時（月～金）

タキザワ漢方

検索

ホームページ:takizawa.asia

副作用被害救済制度の問合せ先  
(独)医薬品医療機器総合機構  
http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai\_camp/index.html  
☎0120-149-931