

第2類医薬品



漢方煎専科

五積散

63

5日分10包



自然のちから、ひとに活かして
株式会社 タキザワ漢方薬

漢方薬 五積散 「タキザワ」

16K

⚠️<使用上の注意>

❌ **してはいけないこと**

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります。)

次の人は服用しないでください。

生後3ヵ月未満の乳児

**相談すること**

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

- (1) 医師の治療を受けている人
- (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人
- (3) 体の虚弱な人(体力の衰えている人、体の弱い人)
- (4) 胃腸の弱い人
- (5) 発汗傾向の著しい人
- (6) 高齢者
- (7) 今までに薬などにより発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人
- (8) 次の症状のある人
むくみ、排尿困難
- (9) 次の診断を受けた人
高血圧、心臓病、腎臓病、甲状腺機能障害

2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この袋を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

| 関係部位 | 症 状 |
|------|-----------|
| 皮膚 | 発疹・発赤、かゆみ |

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

| 症状の名称 | 症 状 |
|-----------------|---|
| 偽アルドステロン症、ミオパチー | 手足のだるさ、しびれ、つっぱり感やこわばりに加えて、脱力感、筋肉痛があらわれ、徐々に強くなる。 |

3. 1ヵ月位(感冒に服用する場合には1週間位)服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この袋を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

4. 長期連用する場合には、医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

【成分・分量】

| | |
|-----------------------|-----------------|
| ソウジュツ……………3.0g | ビヤクシ……………1.0g |
| チンピ……………2.0g | キジツ……………1.0g |
| ブクリョウ……………2.0g | キキョウ……………1.0g |
| ハンゲ……………2.0g | ケイヒ……………1.0g |
| トウキ……………2.0g | マオウ……………1.0g |
| コウボク……………1.0g | タイソウ……………1.0g |
| シャクヤク……………1.0g | ショウキョウ……………1.3g |
| センキュウ……………1.0g | カンソウ……………1.0g |
| 1日分(1包11.15g×2) 22.3g | |

【効能・効果】

体力中等度又はやや虚弱で、冷えがあるものの次の諸症：胃腸炎、腰痛、神経痛、関節痛、月経痛、頭痛、更年期障害、感冒

【用法・用量】

1日2回朝夕の空腹時に、本品1包(1回分)を和紙袋入りのまま、水約300mLを加えて半量ぐらいまで煎じつめ、和紙袋とともに煎じかすを除き、次の量を服用してください。

| 年 齢 | 1回量 |
|-----------|--------|
| 大人(15歳以上) | 全量 |
| 15歳未満7歳以上 | 大人の2/3 |
| 7歳未満4歳以上 | 大人の1/2 |
| 4歳未満2歳以上 | 大人の1/3 |
| 2歳未満 | 大人の1/4 |

<用法・用量に関連する注意>

- (1) 用法・用量を厳守してください。
- (2) 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。
- (3) 1歳未満の乳児には、医師の診療を受けさせることを優先し、やむを得ない場合にのみ服用させてください。

【保管及び取扱い上の注意】

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。
(誤用の原因になったり品質が変わることがあります。)



4 974961 180339



製造販売元

株式会社 タキザワ漢方

さいたま市大宮区堀の内町2丁目623-1

お客様相談室 ☎048-688-7923

受付時間：9時～18時(月～金)

タキザワ漢方



ホームページ:takizawa.asia

副作用被害救済制度の問合せ先

(独)医薬品医療機器総合機構

http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai_camp/index.html

☎0120-149-931