


服用に際しては、この説明文書を必ずお読みください。  
また、必要な時に読めるよう大切に保存してください。

腫 経 (エキス顆粒)  
(漢方製剤)

 使用上の注意



してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる)  
次の人は服用しないこと  
生後3ヵ月未満の乳児。



相談すること

- 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
  - 医師の治療を受けている人。
  - 妊婦又は妊娠していると思われる人。
  - 胃腸が弱く下痢しやすい人。
  - 高齢者。
  - 次の症状のある人。 むくみ
  - 次の診断を受けた人。 高血圧、心臓病、腎臓病
- 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

| 関係部位 | 症 状        |
|------|------------|
| 消化器  | 食欲不振、胃部不快感 |

\*まれに下記の重篤な症状が起こることがある。その場合は直ちに医師の診療を受けること。

| 症状の名称           | 症 状  |
|-----------------|--|
| 間質性肺炎           | 階段を上ったり、少し無理をしたりすると息切れがする・息苦しくなる、空せき、発熱等がみられ、これらが急にあらわれたり、持続したりする。 |
| 偽アルドステロン症、ミオパチー | 手足のだるさ、しびれ、つばり感やこわばりに加えて、脱力感、筋肉痛があらわれ、徐々に強くなる。                     |
| 腸間膜静脈硬化症        | 長期服用により、腹痛、下痢、便秘、腹部膨満等が繰り返しあらわれる。                                  |

- 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること 下痢
- 1ヵ月位服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
- 長期連用する場合には、医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

## 効能・効果

体力中等度のものの次の諸症：頻尿、排尿痛、残尿感、尿のにごり

## 用法・用量

食間に水又はお湯にて服用

| 年齢        | 1回量       | 1日服用回数 |
|-----------|-----------|--------|
| 成人        | 1包 (2.2g) | 3回     |
| 7歳以上15歳未満 | 成人の2/3量   |        |
| 4歳以上7歳未満  | 成人の1/2量   |        |
| 2歳以上4歳未満  | 成人の1/3量   |        |
| 2歳未満      | 成人の1/4量以下 |        |

食間とは…  
食後2～3時間を  
指します。

### 〈用法・用量に関連する注意〉

- (1) 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させること。
- (2) 1歳未満の乳児には、医師の診療を受けさせることを優先し、止むを得ない場合にのみ服用させること。

## 成分・分量

本品3包 (1包2.2g) 中、下記生薬より製した水製エキス (乾燥エキスとして) 1.6gを含有します。

|       |      |       |      |
|-------|------|-------|------|
| ブクリョウ | 2.5g | トウキ   | 1.5g |
| オウゴン  | 1.5g | カンゾウ  | 1.5g |
| シャクヤク | 1.0g | サンシ   | 1.0g |
| ジョウ   | 1.5g | タクシャ  | 1.5g |
| モクツウ  | 1.5g | シャゼンシ | 1.5g |
| カッセキ  | 1.5g |       |      |

添加物として乳糖水和物を含有します。

### 〈成分・分量に関連する注意〉

本剤は、生薬を原料として製造しておりますので、製品の色や味等に多少の差異が生ずることがありますが、品質には変わりありません。

## 保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わることがあります。)
- (4) 1包を分割した残りを使用する場合には、袋の口を折り返して保管し、2日以内に使用してください。
- (5) 使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。使用期限は外箱に記載しています。

## お問い合わせ先

株式会社 建林松鶴堂 お客様相談室  
電話 03-3843-3833  
受付時間 9時から17時まで (土、日、祭日を除く)

製造販売元 たてばやししょうかくどう  
株式会社 **建林松鶴堂**  
〒335-0024 埼玉県戸田市戸田公園3-7