

漢方薬 柴胡清肝湯「タキザワ」

⚠ <使用上の注意>

⊗ **してはいけないこと**

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなります。)

次の人は服用しないでください。

生後3ヵ月未満の乳児



相談すること

- 次の人は服用前に医師又は薬剤師に相談してください。
 - 医師の治療を受けている人
 - 胃腸が弱く下痢しやすい人
 - 今までに薬により発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人
- 次の場合は、直ちに服用を中止し、この袋を持って医師又は薬剤師に相談してください。
 - 服用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	食欲不振、胃部不快感

- 1ヵ月位服用しても症状がよくならない場合
- 長期連用する場合には、医師又は薬剤師に相談してください。
- 次の症状があらわれることがありますので、このような症状の継続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、医師又は薬剤師に相談してください。

下痢
- 本剤の服用により、まれに症状が進行することもありますので、このような場合には、服用を中止し、医師又は薬剤師に相談してください。

【成分・分量】

トウキ	0.75 g	キキョウ	0.75 g	オウレン	0.75 g
シャクヤク	0.75 g	ゴボウシ	0.75 g	オウゴン	0.75 g
センキュウ	0.75 g	カロコン	0.75 g	オウバク	0.75 g
ジオウ	0.75 g	ハッカ	0.75 g	サンシシ	0.75 g
レンギョウ	0.75 g	カンゾウ	0.75 g	サイコ	1.0 g

1日分(1包)11.5g

【効能・効果】

かんの強い傾向のある小児の次の諸症：神経症、慢性扁桃腺炎、湿疹

【用法・用量】

本品1包(1日分)を和紙袋入りのまま、水約300mLを加えて半量ぐらいまで煎じつめ、和紙袋とともに煎じかすを除き、煎液を2回に分けて、朝夕の空腹時に服用してください。


年 齢	1回量
7歳未満 4歳以上	煎液の1/2
4歳未満 2歳以上	7歳未満 4歳以上の2/3(煎液の1/3)
2歳未満	7歳未満 4歳以上の1/2(煎液の1/4)

〈用法・用量に関連する注意〉

- 用法・用量を厳守してください。
- 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。
- 服用は7歳未満のものに限ってください。
- 1歳未満の乳児には、医師の診察を受けさせることを優先し、止むを得ない場合にのみ服用させてください。

【保管及び取扱い上の注意】

- 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- 小児の手の届かない所に保管してください。
- 他の容器に入れ替えないでください。
(誤用の原因になったり品質が変わることがあります。)



4 974961 110077



製造販売元

株式会社 タキザワ漢方薬

さいたま市見沼区片柳412-1
お客様相談室 ☎048-688-7923
受付時間：9時～18時(月～金)



アルミ袋
個包装