

ご使用に際して、この説明書を必ず読んで下さい。  
また、必要な時に読めるよう本剤とともに保存して下さい。

第2類医薬品

(21)

さい こ せい かん さん  
錠剤 柴胡清肝散

⚠ 使用上の注意



## 相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
  - (1)医師の治療を受けている人。
  - (2)妊婦又は妊娠していると思われる人。
  - (3)胃腸が弱く下痢しやすい人。
  - (4)今までに薬などにより発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人。
2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	食欲不振、胃部不快感

まれに下記の重篤な症状が起こることがある。その場合は直ちに医師の診療を受けること。

症状の名称	症 状
腸間膜靜脈硬化症	長期服用により、腹痛、下痢、便秘、腹部膨満等が繰り返しあらわれる。

3. 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
 

下痢
4. 1ヵ月位服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
5. 本剤の服用により、まれに症状が進行することもあるので、このような場合には、服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
6. 長期運用する場合には、医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

## 〔効能・効果〕

体力中等度で、疳の強い傾向（神経過敏）にあるものの次の諸症：  
神經症、慢性扁桃炎、湿疹・皮膚炎、虚弱児の体質改善

## 〔用法・用量〕

食前1時間、温湯で服用する。

年 齢	1回量	1日服用回数
大人	6～8錠	3回
7～13歳迄	3～4錠	

## 〈用法・用量に関する注意〉

小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させること。

[成分・分量] (本剤100錠中)

日局	トウキ末	1.63 g	日局	サンシシ末	1.63 g
日局	シャクヤク末	1.63 g	局外生規	ジオウ末	1.63 g
日局	センキュウ末	1.63 g	別紙規格	カロコン末	1.63 g
日局	キキョウ末	1.63 g	別紙規格	ハッカ末	1.63 g
日局	カンゾウ末	1.63 g	別紙規格	サイコ末	2.18 g
日局	オウレン末	1.63 g	別紙規格	レンギョウ末	1.63 g
日局	オウゴン末	1.63 g	別紙規格	コボウシ末	1.63 g
日局	オウパク末	1.63 g			

[保管及び取扱い上の注意]

- (1)小児の手のとどかない所に保管すること。
- (2)直射日光をさけ、なるべく湿気の少ない、涼しい所に密栓して保管すること。
- (3)誤用をさけ、品質を保持するために、他の容器に入れかえないこと。
- (4)保存の状況が悪いと、場合によっては虫、カビ等がつくことが考えられますので、上記の注意を必ず守って下さい。

本剤は、原料として天然の生薬を用いていますので、製品により多少色が異なったり、開栓後、吸湿により錠剤の色が濃くなる場合がありますが、効果には変わりありません。

[お問い合わせ先]

一元製薬株式会社「お客様相談室」

〒171-0043 東京都豊島区要町3-4-10

電話：03-3957-2997

○受付時間：9:00～17:00(土、日、祝祭日を除く)



一元製薬株式会社

東京都豊島区要町3-4-10