



第2類医薬品

漢方煎専科

# 酸棗仁湯

103

5日分10包



自然のちから、ひとに活かして  
株式会社 タキザワ漢方廠

## 漢方薬 酸棗仁湯 「タキザワ」

16E

## ⚠️&lt;使用上の注意&gt;

## ❌ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります。)

次の人は服用しないでください。  
生後3ヵ月未満の乳児

## 相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

- (1) 医師の治療を受けている人
- (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人
- (3) 胃腸の弱い人
- (4) 下痢又は下痢傾向のある人
- (5) 高齢者
- (6) 次の症状のある人  
むくみ
- (7) 次の診断を受けた人  
高血圧、心臓病、腎臓病

2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この袋を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関係部位	症 状
消化器	吐き気、食欲不振、胃部不快感

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。  
その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症 状
偽アルドステロン症、 ミオパチー	手足のだるさ、しびれ、つっぱり感やこわばりに加えて、脱力感、筋肉痛があらわれ、徐々に強くなる。

3. 服用後、次の症状があらわれることがありますので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この袋を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

下痢

4. 1週間位服用しても症状がよくなりません場合は服用を中止し、この袋を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

5. 長期連用する場合には、医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

## 【成分・分量】

サンソウニン.....15.0g ブクリョウ.....5.0g  
チモ.....3.0g カンゾウ.....1.0g  
センキュウ.....3.0g

1日分(1包13.5g×2) 27.0g

## 【効能・効果】

体力中等度以下で、心身が疲れ、精神不安、不眠などがあるものの次の諸症：不眠症、神経症

## 【用法・用量】

1日2回朝夕の空腹時に、本品1包(1回分)を和紙袋入りのまま、水約300mLを加えて半量ぐらいまで煎じつめ、和紙袋とともに煎じかすを除き、次の量を服用してください。

年 齢	1回量
大人(15歳以上)	全量
15歳未満7歳以上	大人の2/3
7歳未満4歳以上	大人の1/2
4歳未満2歳以上	大人の1/3
2歳未満	大人の1/4以下

## &lt;用法・用量に関連する注意&gt;

- (1) 用法・用量を厳守してください。
- (2) 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。
- (3) 1歳未満の乳児には、医師の診療を受けさせることを優先し、止むを得ない場合にのみ服用させてください。

## 【保管及び取扱い上の注意】

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。  
(誤用の原因になったり品質が変わることがあります。)



4 974961 180094



製造販売元  
株式会社 タキザワ漢方薬  
さいたま市大宮区堀の内町2丁目623-1  
お客様相談室 ☎048-688-7923  
受付時間：9時～18時(月～金) ホームページ:takizawa.asia

タキザワ漢方

検索

副作用被害救済制度の問合せ先  
(独)医薬品医療機器総合機構

http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai\_camp/index.html

☎0120-149-931