

タキザワの

漢方煎薬

第2類医薬品

5日分10包  
68

芍藥甘草湯「タキザワ」



株式会社タキザワ漢方廠

2014年12月（記載要領変更に伴う改訂）

第2類医薬品

# 漢方薬 苓葉甘草湯「タキザワ」

14L

## △<使用上の注意>

### ☒ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります。)

1. 次の人は服用しないでください。

(1) 生後3ヵ月未満の乳児

(2) 次の診断を受けた人  
心臓病

2. 症状があるときのみの服用にとどめ、連用しないでください。

### ℞ 相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

(1) 医師の治療を受けている人

(2) 妊婦又は妊娠していると思われる人

(3) 高齢者

(4) 次の症状のある人  
むくみ

(5) 次の診断を受けた人  
高血圧、腎臓病

2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性がありますので、直ちに服用を中止し、この袋を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。  
その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症 状
間質性肺炎	階段を上ったり、少し無理をしたりすると息切れがする・息苦しくなる、空せき、発熱等がみられ、これらが急にあらわれたり、持続したりする。
偽アルドステロン症、ミオバチー	手足のだるさ、しびれ、つっぱり感やこわばりに加えて、脱力感、筋肉痛があらわれ、徐々に強くなる。
うっ血性心不全、心室頻拍	全身のだるさ、動悸、息切れ、胸部の不快感、胸が痛む、めまい、失神等があらわれる。
肝機能障害	発熱、かゆみ、発疹、黄疸（皮膚や白目が黄色くなる）、褐色尿、全身のだるさ、食欲不振等があらわれる。

3. 5~6回服用しても症状が良くならない場合は服用を中止し、この袋を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

### 【成分・分量】

シャクヤク………3.0g カンゾウ…………3.0g  
1日分（1包3.0g×2）6.0g

### 【効能・効果】

体力に関わらず使用でき、筋肉の急激なけいれんを伴う痛みのあるものの次の諸症：こむらがえり、筋肉のけいれん、腹痛、腰痛

### 【用法・用量】

1日2回朝夕の空腹時に、本品1包（1回分）を和紙袋入りのまま、水約300mLを加えて半量ぐらいまで煎じ、和紙袋とともに煎じかすを除き、次の量を服用してください。

年 齢	1回量
大人（15歳以上）	全量
15歳未満7歳以上	大人の2/3
7歳未満4歳以上	大人の1/2
4歳未満2歳以上	大人の1/3
2歳未満	大人の1/4

### 【用法・用量に関する注意】

- 用法・用量を厳守してください。
- 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。
- 1歳未満の乳児には、医師の診療を受けさせることを優先し、止むを得ない場合にのみ服用させてください。

### 【保管及び取扱い上の注意】

- 直射日光の当たらない温氣の少ない涼しい所に保管してください。
- 小児の手の届かない所に保管してください。
- 他の容器に入れ替えないでください。  
(誤用の原因になったり品質が変わることがあります。)



4 974961 110350



製造販売元  
株式会社タキザワ漢方廠  
さいたま市見沼区片柳412-1  
お客様相談室☎048-688-7923  
受付時間：9時～18時（月～金）

タキザワ漢方

検索

ホームページ:takizawa.asia

副作用被害救済制度の問合せ先  
(独)医薬品医療機器総合機構  
<http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai.html>

■ 0120-149-931

