

第2類医薬品



漢方煎専科

芍薬甘草湯

68

5日分10包



自然のちから、ひとに活かして

株式会社 アキザワ漢方廠

# 漢方薬 芍薬甘草湯 「タキザワ」

16J

## △＜使用上の注意＞

### ⊗ してはいけないこと

（守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります。）

- 次の人は服用しないでください。
  - 生後3ヵ月未満の乳児
  - 次の診断を受けた人  
心臓病
- 症状があるときのみ服用にとどめ、連用しないでください。



### 相談すること

- 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
  - 医師の治療を受けている人
  - 妊婦又は妊娠していると思われる人
  - 高齢者
  - 次の症状のある人  
むくみ
  - 次の診断を受けた人  
高血圧、腎臓病

- 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この袋を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

| 症状の名称           | 症 状  |
|-----------------|--|
| 間質性肺炎           | 階段を上ったり、少し無理をしたりすると息切れがする・息苦しくなる、空せき、発熱等がみられ、これらが急にあらわれたり、持続したりする。 |
| 偽アルドステロン症、ミオパチー | 手足のだるさ、しびれ、つっぱり感やこばりに加えて、脱力感、筋肉痛があらわれ、徐々に強くなる。                     |
| うっ血性心不全、心室頻拍    | 全身のだるさ、動悸、息切れ、胸部の不快感、胸が痛む、めまい、失神等があらわれる。                           |
| 肝機能障害           | 発熱、かゆみ、発疹、黄疸（皮膚や白目が黄色くなる）、褐色尿、全身のだるさ、食欲不振等があらわれる。                  |

- 5～6回服用しても症状が良くならない場合は服用を中止し、この袋を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

【成分・分量】  
 シャクヤク……………3.0g カンゾウ……………3.0g  
 1日分（1包3.0g×2）6.0g

### 【効能・効果】

体力に関わらず使用でき、筋肉の急激なけいれんを伴う痛みのあるものの次の諸症：こむらえり、筋肉のけいれん、腹痛、腰痛

### 【用法・用量】

1日2回朝夕の空腹時に、本品1包（1回分）を和紙袋入りのまま、水約300mLを加えて半量ぐらいまで煎じつめ、和紙袋とともに煎じかすを除き、次の量を服用してください。

| 年 齢       | 1回量    |
|-----------|--------|
| 大人(15歳以上) | 全量     |
| 15歳未満7歳以上 | 大人の2/3 |
| 7歳未満4歳以上  | 大人の1/2 |
| 4歳未満2歳以上  | 大人の1/3 |
| 2歳未満      | 大人の1/4 |

### ＜用法・用量に関連する注意＞

- 用法・用量を厳守してください。
- 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。
- 1歳未満の乳児には、医師の診療を受けさせることを優先し、やむを得ない場合にのみ服用させてください。

### 【保管及び取扱い上の注意】

- 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- 小児の手の届かない所に保管してください。
- 他の容器に入れ替えないでください。（誤用の原因になったり品質が変わることがあります。）



4 974961 180322

製造販売元  
 株式会社 タキザワ漢方薬  
 さいたま市大宮区堀の内町2丁目623-1  
 お客様相談室 ☎048-688-7923  
 受付時間：9時～18時（月～金）

タキザワ漢方



ホームページ:takizawa.asia

副作用被害救済制度の問合せ先  
 （独）医薬品医療機器総合機構  
[http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai\\_camp/index.html](http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai_camp/index.html)  
 ☎0120-149-931