



第2類医薬品

漢方煎専科

清上防風湯

58

5日分10包



自然のちから、ひとに活かして
株式会社 タキザワ漢方廠

漢方薬 清上防風湯 「タキザワ」

16D

⚠️<使用上の注意>



相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

- (1) 医師の治療を受けている人
- (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人
- (3) 胃腸の弱い人
- (4) 高齢者
- (5) 次の症状のある人
むくみ
- (6) 次の診断を受けた人
高血圧、心臓病、腎臓病

2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この袋を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関係部位	症 状
消化器	食欲不振、胃部不快感

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症 状
偽アルドステロン症、ミオパチー	手足のだるさ、しびれ、つっぱり感やこわばりに加えて、脱力感、筋肉痛があらわれ、徐々に強くなる。
肝機能障害	発熱、かゆみ、発疹、黄疸(皮膚や白目が黄色くなる)、褐色尿、全身のだるさ、食欲不振等があらわれる。

3. 1ヵ月位服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この袋を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

4. 長期連用する場合には、医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

5. 本剤の服用により、まれに症状が進行することもありますので、このような場合には、服用を中止し、この袋を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

【成分・分量】

ケイガイ	1.5g	センキュウ	3.0g
オウレン	1.5g	オウゴン	3.0g
ハッカ	1.5g	レンギョウ	3.0g
キジツ	1.5g	ビャクシ	3.0g
カンゾウ	1.5g	キキョウ	3.0g
サンシシ	3.0g	ポウフウ	3.0g
1日分(1包14.25g×2) 28.5g			

【効能・効果】

体力中等度以上で、赤ら顔でときにのぼせがあるものの次の諸症：にきび、顔面・頭部の湿疹・皮膚炎、あかはな(酒さ)

【用法・用量】

本品2包(1日分)を和紙袋入りのまま、水約600mLを加えて半量くらいまで煎じつめ、和紙袋とともに煎じかすを除き、煎液を2回に分けて、朝夕の空腹時に、次の量を服用してください。

年 齢	1 回 量
大人(15歳以上)	煎液の1/2
15歳未満7歳以上	煎液の1/3
7歳未満	服用しないこと

又は1日2回朝夕の空腹時に、本品1包(1回分)を和紙袋入りのまま、水約300mLを加えて上記と同様に製し、次の量を服用してください。

年 齢	1 回 量
大人(15歳以上)	煎液全部
15歳未満7歳以上	煎液の2/3
7歳未満	服用しないこと

<用法・用量に関連する注意>

- (1) 用法・用量を厳守してください。
- (2) 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。

【保管及び取扱い上の注意】

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。
(誤用の原因になったり品質が変わることがあります。)



製造販売元

株式会社 タキザワ漢方薬

さいたま市大宮区堀の内町2丁目623-1
お客様相談室 ☎048-688-7923
受付時間：9時～18時(月～金)

タキザワ漢方

検索

ホームページ:takizawa.asia

副作用被害救済制度の問合せ先

(独)医薬品医療機器総合機構

http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai_camp/index.html

☎0120-149-931