

第2類医薬品

この添付文書は必要な時に読めるように大切に保管し、服用の際には必ずお読みください。

漢方製剤



JPS 漢方顆粒-72号

疎経活血湯は痛みやしびれのある方の神経痛、腰痛、筋肉痛などを改善します。血液の流れを良くし、痛みを鎮める働きがあります。

本剤は漢方処方である疎経活血湯の生薬を抽出し、乾燥エキスとした後、服用しやすい顆粒剤としました。



使用上の注意



してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)

次の人は服用しないでください

生後3ヵ月未満の乳児。



相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

- (1) 医師の治療を受けている人。
- (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
- (3) 胃腸が弱く下痢しやすい人。
- (4) 今までに薬などにより発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人。

2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性がありますので、直ちに服用を中止し、この添付文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	食欲不振、胃部不快感

3. 1ヵ月位服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この添付文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

[効能・効果]

体力中等度で、痛みがあり、ときにしびれがあるものの次の諸症：関節痛、神経痛、腰痛、筋肉痛

**〔用法・用量〕**

次の量を食前又は食間に水又はお湯にて服用してください。

年 齢	1 回量	1 日服用回数
成人（15 才以上）	1 包	3 回
7 才以上 15 才未満	2/3包	
4 才以上 7 才未満	1/2包	
2 才以上 4 才未満	1/3包	
2 才未満	1/4包	

**〈用法・用量に関連する注意〉**

- (1) 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。
- (2) 1 才未満の乳児には、医師の診療を受けさせることを優先し、止むを得ない場合にのみ服用させてください。
- (3) 食間とは食後 2～3 時間を指します。

**〔成分・分量〕**

3包(7.5g)中

疎経活血湯乾燥エキス4.8gを含有しています。

日局ト ウ キ …… 1.6 g	日局ジ オ ウ …… 1.6 g
日局ソウジュツ …… 1.6 g	日局センキュウ …… 1.6 g
日局ト ウ ニ ン …… 1.6 g	日局ブクリョウ …… 1.6 g
日局シャクヤク …… 2.0 g	日局ゴ シ ツ …… 1.2 g
日局イレイセン …… 1.2 g	日局ボ ウ イ …… 1.2 g
日局キョウカツ …… 1.2 g	日局ボ ウ フ ウ …… 1.2 g
日局リュウタン …… 1.2 g	日局シヨウキョウ …… 0.4 g
日局チ ン ピ …… 1.2 g	日局ビ ャ ク シ …… 0.8 g
日局カ ン ゾ ウ …… 0.8 g	

上記生薬量に相当します

添加物として、ステアリン酸Mg、シヨ糖脂肪酸エステル、乳糖水和物を含有しています。

**〔保管及び取扱い上の注意〕**

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わることがあります。)
- (4) 本剤は吸湿しやすいので、1 包を分割した残りを服用する場合には、袋の口を折り返してテープ等で封をし、なるべく 1 日以内に服用してください。(開封状態で置いておくと顆粒が変色することがあります。変色した場合は、服用しないでください。)
- (5) 本剤は生薬(薬用の草根木皮等)を原料として使用していますので、製品により色調等が異なることがありますが、効能・効果には変わりありません。
- (6) 使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。

本剤についてのお問い合わせは、お買い求めのお店  
あるいは下記をお願いいたします。  
ジェーピーエス製薬 お客様相談室  
電 話 045(593)2136  
受付時間 9:00～17:00(土、日、祝日を除く)

副作用被害救済制度の問い合わせ先  
(独)医薬品医療機器総合機構  
<http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai.html>  
電話 0120-149-931(フリーダイヤル)



**ジェーピーエス製薬株式会社**

製造販売元 栃木県芳賀郡芳賀町芳賀台196-1  
発 売 元 横浜市都筑区東山田4-42-22