

漢方製剤

そ けい かっ けつ とう  
**疎経活血湯**

(販売名：JPS漢方顆粒-72号)

疎経活血湯は痛みやしびれのある方の神経痛、腰痛、筋肉痛などを改善します。血液の流れを良くし、痛みを鎮める働きがあります。

本剤は漢方処方である疎経活血湯の生薬を抽出し、乾燥エキスとした後、服用しやすい顆粒剤としました。

 使用上の注意

## してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)

次の人は服用しないでください

生後3ヵ月未満の乳児。



## 相談すること

- 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください  
(1) 医師の治療を受けている人。  
(2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。  
(3) 胃腸が弱く下痢しやすい人。  
(4) 今までに薬などにより発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人。
- 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この添付文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	食欲不振、胃部不快感

- 1ヵ月位服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この添付文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

## 〔効能・効果〕

体力中等度で、痛みがあり、ときにしびれがあるものの次の諸症：関節痛、神経痛、腰痛、筋肉痛

## 〔用法・用量〕

次の量を食前又は食間に水又は白湯にて服用してください。

年 齢	1 回 量	1 日 服 用 回 数
成人（15才以上）	1 包	3 回
7才以上15才未満	2/3包	
4才以上7才未満	1/2包	
2才以上4才未満	1/3包	
2才未満	1/4包	

### 〔用法・用量に関連する注意〕

- (1) 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。
- (2) 1才未満の乳児には、医師の診療を受けさせることを優先し、止むを得ない場合にのみ服用させてください。
- (3) 食間とは食後2～3時間を指します。

## 〔成分・分量〕

3包(7.5 g)中

疎経活血湯乾燥エキス4.8gを含有しています。

日局ト ウ キ …………… 1.6 g	日局ジ オ ウ …………… 1.6 g
日局ソウジュツ …………… 1.6 g	日局センキュウ …………… 1.6 g
日局ト ウ ニ ン …………… 1.6 g	日局ブクリョウ …………… 1.6 g
日局シャクヤク …………… 2.0 g	日局ゴ シ ツ …………… 1.2 g
日局イレイセン …………… 1.2 g	日局ボ ウ イ …………… 1.2 g
日局キョウカツ …………… 1.2 g	日局ボ ウ フ ウ …………… 1.2 g
日局リュウタン …………… 1.2 g	日局ショウキョウ …………… 0.4 g
日局チ ン ビ …………… 1.2 g	日局ビ ャ ク シ …………… 0.8 g
日局カ ン ゴ ウ …………… 0.8 g	

上記生薬量に相当します

添加物として、ステアリン酸Mg、シヨ糖脂肪酸エステル、乳糖水和物を含有しています。

### 〔保管及び取扱い上の注意〕

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わることがあります。)
- (4) 本剤は吸湿しやすいので、1包を分割した残りを服用する場合には、袋の口を折り返してテープ等で封をし、なるべく1日以内に服用してください。(開封状態で置いておくと顆粒が変色することがあります。変色した場合は、服用しないでください。)
- (5) 本剤は生薬(薬用の草根木皮等)を原料として使用していますので、製品により色調等が異なることがありますが、効能・効果には変わりありません。
- (6) 使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。

本剤についてのお問い合わせは、お買い求めのお店あるいは下記にお願いいたします。

イスクラ産業株式会社 お客様相談室  
電 話：03-3281-3363  
受付時間：10:00～12:00、13:00～17:00  
(土、日、祝日を除く)

副作用被害救済制度の問い合わせ先

(独)医薬品医療機器総合機構

[https://www.pmda.go.jp/kenkouhigai\\_camp/index.html](https://www.pmda.go.jp/kenkouhigai_camp/index.html)

電話 0120-149-931(フリーダイヤル)

発 売 元 **イスクラ産業株式会社**  
東京都中央区日本橋1-14-2

製造販売元 **ジェービーエス製薬株式会社**  
栃木県芳賀郡芳賀町芳賀台196-1