

ご使用に際しては、この添付文書を必ずお読み下さい。また、必要な時に読めるよう大切に保管して下さい。

第2類医薬品

# ウチダの漢方製剤 ウチダの 疎風定痛湯 (分包) ソフウテイツウトウ

# 62

分包

ウチダの疎風定痛湯(分包)は、漢方処方にしたがい生薬を配合し抽出して得た水製エキスを用いた散剤(細粒)の分包にしたものです。



### 使用上の注意



#### してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなる)

次の方は服用しないこと  
生後3ヵ月未満の乳児。



#### 相談すること

- 次の方は服用前に医師又は薬剤師に相談すること
  - 医師の治療を受けている人。
  - 妊婦又は妊娠していると思われる人。
  - 胃腸が弱く下痢しやすい人。
  - 今までに薬により発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人。
- 次の場合は、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師又は薬剤師に相談すること
  - 服用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	食欲不振、胃部不快感

- 1ヵ月位服用しても症状がよくなる場合

### 効能・効果

関節痛、神経痛、腰痛、筋肉痛

### 用法・用量

次の1回量を1日3回食前または食間に服用する。

年齢	1回量
大人(15歳以上)	1包
15歳未満7歳以上	2/3包
7歳未満4歳以上	1/2包
4歳未満2歳以上	1/3包
2歳未満	1/4包

### 用法・用量に関連する注意

- 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させること。

\* (2) 1歳未満の乳児には、医師の診療を受けさせることを優先し、止むを得ない場合にのみ服用させること。

### 成分・分量

本品1日量〔3包(1包2.5g)〕中

シャクヤク	1.25g
ジオウ	1.0g
センキュウ	1.0g
トウキ	1.0g
ソウジュツ	1.0g
トニン	1.0g
ブクリョウ	1.0g
ゴシツ	0.75g
チンピ	0.75g
ボウイ	0.75g
ボウフウ	0.75g
リュウタン	0.75g
カンゾウ	0.5g
ビャクシ	0.5g
ショウキョウ	0.25g
イレイセン	0.75g
キョウカツ	0.75g

疎経活血湯エキス 4.03g

賦形剤として乳糖水和物・パレイショデンプン、吸湿防止剤としてメタケイ酸アルミン酸Mgを含有する。

### 保管及び取扱い上の注意

- 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管すること。
- 小児の手の届かない所に保管すること。
- 他の容器に入れ替えないこと。(誤用の原因になったり品質が変わる。)
- 小児で1包を分割した残りを服用する場合には、袋の口を折り曲げて保管し、2日以内に服用すること。

### お問い合わせ先

本品の内容についてのお問い合わせは、お買い求めのお店または下記にお願い申し上げます。

株式会社 ウチダ和漢薬 03-3806-4141  
受付時間 9:00~17:30(土、日、祝日を除く)

本剤は生薬を原料としていますので、製品により多少色が異なることがあります。効能・効果にかわりはありません。



株式会社 ウチダ和漢薬  
東京都中央区日本橋本町 4-2-8