

Kracie

ご使用に際して、この説明文書を必ずお読みください。
また、必要な時に読めるように大切に保管してください。

第2類医薬品

漢方製剤

疎経活血湯エキス錠クラシエ

(ソケイカクツトウ)

特 徴

- 「疎経活血湯」は、漢方の古典といわれる中国の医書「万病回春」^{マンビョウカイシュン}に収載されている薬方です。
- 腰痛、筋肉痛などに効果があります。

⚠ 使用上の注意



相談すること

1. 次の人は服用前に医師又は薬剤師に相談してください
(1) 医師の治療を受けている人
(2) 妊婦又は妊娠していると思われる人
(3) 胃腸が弱く下痢しやすい人
(4) 今までに薬により発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人
2. 次の場合は、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師又は薬剤師に相談してください
(1) 服用後、次の症状があらわれた場合

| 関係部位 | 症 状 |
|-------|------------|
| 皮 膚 | 発疹・発赤、かゆみ |
| 消 化 器 | 食欲不振、胃部不快感 |

- (2) 1ヵ月位服用しても症状がよくなる場合

効 能

関節痛、神経痛、腰痛、筋肉痛



関節痛



神経痛

用法・用量

次の量を1日3回食前又は食間に水又は白湯にて服用。

| 年 齢 | 1回量 | 1日服用回数 |
|-----------|---------|--------|
| 成人（15才以上） | 4錠 | 3回 |
| 15才未満7才以上 | 3錠 | |
| 7才未満5才以上 | 2錠 | |
| 5才未満 | 服用しないこと | |

〈用法・用量に関連する注意〉

小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。

成分

成人1日の服用量12錠(1錠353mg)中、次の成分を含んでいます。
疎経活血湯エキス粉末 ……………3,000mg

〔ジオウ・トウキ・トウニン・センキュウ・ブクリョウ・ビャクジュツ〕
各1.0g、ゴシツ・リュウタン・チンピ・キョウカツ・イレイセン・ポウ
イ・ボウフウ各0.75g、ビャクシ・カンゾウ各0.5g、シャクヤク
1.25g、ショウキョウ0.25gより抽出。

添加物として、タルク、ステアリン酸Mg、CMC-Ca、CMC-Na、
二酸化ケイ素、ポリオキシエチレンポリオキシプロピレングリコール、
ヒプロメロースを含有する。

〈成分に関連する注意〉

本剤は天然物(生薬)のエキスをを用いていますので、錠剤の色が多少異なることがあります。

保管及び取扱い上の注意

- (1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
(ビン包装の場合は、密栓して保管してください。なお、ビンの中
の詰物は、輸送中に錠剤が破損するのを防ぐためのものです。
開栓後は不要となりますのですててください。)
- (2)小児の手の届かない所に保管してください。
- (3)他の容器に入れ替えないでください。
(誤用の原因になったり品質が変わります。)
- (4)使用期限のすぎた商品は服用しないでください。
- (5)水分が錠剤につきますと、変色または色むらを生じることがあり
ますので、誤って水滴を落したり、ぬれた手で触れないでくださ
い。
- (6)4錠分包の場合、1包を分割した残りを服用する時は、袋の口を
折り返して保管してください。なお、2日をすぎた場合には服用
しないでください。



健康アドバイス

●保温を心がけま しょう



神経痛などの痛みは、寒冷
や湿気によって強くなるこ
とがあります。保温を心が
けましょう。お風呂などで
体を温めると、痛みが和ら
ぐだけでなく、関節も動か
しやすくなります。

●カルシウムの 摂取を



骨や筋肉を強くするため、
ふだんからカルシウムの
多い食物を摂取するとと
もに、日光浴や運動など
を心がけることが大切で
す。

副作用被害救済制度の問合せ先
(独)医薬品医療機器総合機構
<http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai.html>
☎ 0120-149-931

本剤について、何かお気づきの点がございましたら、お買い求めのお店
又は下記までご連絡いただきますようお願い申し上げます。

クラシエ薬品株式会社 お客様相談窓口 ☎ (03) 5446-3334
受付時間 10:00~17:00 (土、日、祝日を除く)

ホームページ www.kracie.co.jp

発売元 **クラシエ薬品株式会社**
東京都港区海岸3-20-20 (〒108-8080)

製造販売元 **大峰堂薬品工業株式会社**
奈良県大和高田市根成柿574 (〒635-0051)