

タキザワの

漢方煎薬

第2類医薬品

5日分10包
84

大黃甘草湯「タキザワ」



株式会社タキザワ漢方廠

漢方薬 大黃甘草湯「タキザワ」

△＜使用上の注意＞

09J

❌ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなります。)

1. 次の人は服用しないでください。
生後3ヵ月未満の乳児
2. 本剤を服用している間は、次の医薬品を服用しないでください。
他の瀉下薬（下剤）
3. 授乳中の人は本剤を服用しないか、本剤を服用する場合は授乳を避けてください。



相談すること

1. 次の人は服用前に医師又は薬剤師に相談してください。
 (1) 医師の治療を受けている人 (5) 高齢者 (7) 次の診断を受けた人
 (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人 (6) 次の症状のある人 高血圧、心臓病、腎臓病
 (3) 体の虚弱な人(体力の衰えている人、体の弱い人) むくみ
 (4) 胃腸が弱く下痢しやすい人
2. 次の場合は、直ちに服用を中止し、この袋を持って医師又は薬剤師に相談してください。
 (1) 服用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症 状
消化器	はげしい腹痛を伴う下痢、腹痛

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症 状
偽アルドステロン症	尿量が減少する、顔や手足がむくむ、まぶたが重くなる、手がこわばる、血圧が高くなる、頭痛等があらわれる。

- (2) 5～6日間服用しても症状がよくなる場合
3. 長期連用する場合には、医師又は薬剤師に相談してください。
4. 次の症状があらわれることがありますので、このような症状の継続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、医師又は薬剤師に相談してください。
下痢

【成分・分量】

ダイオウ……………4.0g カンゾウ……………1.0g 1日分(1包2.5g×2)5.0g

【効能・効果】

便秘、便秘に伴う頭重・のぼせ・湿疹・皮膚炎・ふきでもの(にきび)・食欲不振(食欲減退)・腹部膨満・腸内異常醗酵・痔などの症状の緩和(*)

＜効能・効果に関連する注意＞

体力に関わらず、使用できる。(*)

【用法・用量】

1日2回朝夕の空腹時に、本品1包(1回分)を和紙袋入りのまま、水約300mLを加えて半量ぐらいまで煎じつめ、和紙袋とともに煎じかすを除き、右の量を服用してください。

＜用法・用量に関連する注意＞

- (1) 用法・用量を厳守してください。
- (2) 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。
- (3) 1歳未満の乳児には、医師の診療を受けさせることを優先し、止むを得ない場合にのみ服用させてください。

年 齢	1 回 量
大人(15歳以上)	全 量
15歳未満7歳以上	大人の2/3
7歳未満4歳以上	大人の1/2
4歳未満2歳以上	大人の1/3
2歳未満	大人の1/4以下

【保管及び取扱い上の注意】

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わることがあります。)



製造販売元
株式会社 タキザワ 漢方薬
さいたま市見沼区片柳412-1
お客様相談室 ☎048-688-7923
受付時間：9時～18時(月～金)

副作用被害救済制度の問合せ先
(独)医薬品医療機器総合機構
<http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai.html>
☎ 0120-149-931

