

ご使用に際しては、この添付文書を必ずお読み下さい。また、必要な時に読めるよう大切に保管して下さい。

第2類医薬品

ウチダの漢方製剤

ウチダの 猪苓湯 エキス散

チョレイトウ

ウチダの猪苓湯エキス散は、漢方処方にしたいが生薬を配合し抽出して得た水製エキスを用いやすく散剤(細粒)としたものです。

保管及び取扱い上の注意

- (1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管すること。
- (2)小児の手の届かない所に保管すること。
- (3)他の容器に入れ替えないこと。(誤用の原因になったり品質が変わる。)



使用上の注意



してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなる)

次の人は服用しないこと
生後3ヵ月未満の乳児。



相談すること

1. 次の人は服用前に医師又は薬剤師に相談すること

(1)医師の治療を受けている人。

* (2)妊婦又は妊娠していると思われる人。

2. 次の場合は、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師又は薬剤師に相談すること

(1)服用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ

(2)1ヵ月位服用しても症状がよくなる場合

お問い合わせ先

本品の内容についてのお問い合わせは、お買い求めのお店または下記にお願い申し上げます。

株式会社 ウチダ和漢薬 03-3806-4141

受付時間 9:00~17:30(土、日、祝日を除く)

効能・効果

尿量が減少し、尿が出にくく、排尿痛あるいは残尿感のあるもの。

用法・用量

次の1回量を1日3回食前又は食間に服用する。

年齢	1回量
大人(15歳以上)	2g
15歳未満7歳以上	大人の2/3の量(1.33g)
7歳未満4歳以上	大人の1/2の量(1.0g)
4歳未満2歳以上	大人の1/3の量(0.66g)
2歳未満	大人の1/4以下の量(0.5g以下)

用法・用量に関連する注意

(1)添付のサジ1ばいが約1gです。

(2)小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させること。

** (3)1歳未満の乳児には、医師の診療を受けさせることを優先し、止むを得ない場合にのみ服用させること。

成分・分量

本品1日量(6g)中

猪苓湯エキス.....4.08g

下記生薬から抽出した水製乾燥エキス.....1.08g

チヨレイ.....3.0g

ブクリョウ.....3.0g

カッセキ.....3.0g

タクシャ.....3.0g

アキョウ.....3.0g

賦形剤として乳糖・バレイシヨデンブン、吸湿防止剤として軽質無水ケイ酸、その他1成分を含有する。

本剤は生薬を原料としていますので、製品により多少色が異なることがあります。効能・効果にかわりはありません。



株式会社 ウチダ和漢薬

東京都中央区日本橋本町 4-2-8