

この添付文書は、本剤をご服用になる前に、かならずお読みください。
また、ご服用になる間は、いつでも読めるよう保管しておいてください。

漢方製剤 **てんぐ^{はち}八^み味^{がん}丸** 第2類医薬品

てんぐ八味丸は、漢方処方八味地黄丸の配合比率にしたがって、8種の生薬末を合わせ、結合剤（ハチミツ）を加えて、飲みやすい丸薬としたものです。



使用上の注意

してはいけないこと



（守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります。）

次の人は服用しないで下さい。

- (1) 胃腸の弱い人。
- (2) 下痢しやすい人。

相談すること



1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。
 - (1) 医師の治療を受けている人。
 - (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
 - (3) のぼせが強く赤ら顔で体力の充実している人。
 - (4) 今までに薬などにより発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人。
2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	食欲不振、胃部不快感、腹痛
その他	動悸、のぼせ、口唇、舌のしびれ

3. 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。
下痢
4. 1ヵ月位服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。

<成分・分量> 1日量60丸中

成 分	60丸中	基 原
タクシャ末	0.67g	Alismatis Rhizoma オモダカ科。サジオモダカの塊茎で、通例、周皮を除いたもの。
ブクリョウ末	0.67g	Poria サルノコシカケ科。マツホドの菌核。
ボタンピ末	0.67g	Moutan Cortex ボタン科。ボタンの根皮。
ケイヒ末	0.22g	Cinnamomi Cortex クスノキ科。Cinnamomum cassia Blume (Lauraceae) の樹皮又は周皮の一部を除いたもの。
ジオウ末	1.77g	Rehmanniae Radix ゴマノハグサ科。アカヤジオウ又はその近縁植物の根又はそれを蒸したもの。
サンシュユ末	0.89g	Corni Fructus ミズキ科。サンシュユの偽果の果肉。
サンヤク末	0.89g	Dioscoreae Rhizoma ヤマイモ科。ヤマノイモ又はナガイモの周皮を除いた根茎。
加工ブシ末	0.22g	Processi Aconiti Radix キンボウゲ科のハナトリカブト又はオクトリカブトの塊根を加工したもの。

添加物としてハチミツ、セラックを含有する。

<効能・効果>

体力中等度以下で、疲れやすく、四肢が冷えやすく、尿量減少又は多尿でときに口渇があるものの次の諸症：

下肢痛、腰痛、しびれ、高齢者のかすみ目、かゆみ、排尿困難、残尿感、夜間尿、頻尿、むくみ、高血圧に伴う随伴症状の改善（肩こり、頭重、耳鳴り）、軽い尿漏れ

- 疲れやすく・・・主に年齢的なもの（老化現象）や新陳代謝機能の衰えなどによる疲れ。
 - 四肢が冷えやすく・・・手足が冷えやすい、あるいは足先がほてる方、また足腰に力が入らない、腰や足が痛む、あるいはしびれる方。
 - 尿量減少又は多尿・・・尿の回数が多いのに尿量の少ない方、又は全体的に排尿の量の少ない方、排尿のたびに尿の出が悪く尿が残る感じのする方、あるいは排尿が困難な方、これと逆に尿の量の多い方、特に夜間たびたび尿意を催す方。
 - ときに口渇・・・口がかわき、お茶や飲み物を多くとる方、あるいは口がかわき水を少しずつ何度もむ方。
 - 高齢者のかすみ目・・・老化現象によるかすみ目。
 - かゆみ・・・老人などに見られる皮膚乾燥によるかゆみ。
 - 頻尿、むくみ・・・尿の回数の多い方、尿量あるいは排尿の異常によるむくみのある方。
- 上記のような症状がいくつかある方にこの薬は用いますが、全体的に言えば、下半身に力がなく息切れがしたり疲れやすく、また夜間排尿に起きるようなことのある老化現象に用います。

<用法・用量>

次の1回量を1日3回、白湯又は常水にて通常食間に服用して下さい。

食間とは・・・食後2～3時間を指します。

年 齢	1 回 量
成 人（15歳以上）	20 丸
15歳未満	服用しないこと

保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管して下さい。
- (2) 小児の手の届かない所に保管して下さい。
- (3) 他の容器に入れ替えないで下さい。（誤用の原因になったり品質が変わります。）

お問合せ先

二反田薬品工業株式会社 お客様相談室 TEL 0823-31-1515
受付時間：9時から17時まで（土、日、祝日を除く）



製造販売元

二反田薬品工業株式会社

〒737-0845 広島県呉市吉浦新町2丁目5番2号