

切り取り線

吸湿しやすいため、服用のつどチャックをしっかりしめること

服用に際して、この説明文書を必ずお読みください。又、必要な時に読めるよう大切に保管してください

販売名：ジープエルスリムL 第2類医薬品 168錠

▲ 使用上の注意

- 相談すること** 1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること  
 (1) 医師の治療を受けている人。(2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。(3) 今までに薬などにより発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人。  
 2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

関係部位	症状	まれに右記の重篤な症状が起こることがある。その場合は直ちに医師の診察を受けること	症状の名称	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ		間質性肺炎	階段を上ったり、少し無理をしたらすると息切れがする・息苦しくなる、空せき、発熱等がみられ、これらが急にあらわれたり、持続したりする。
消化器	食欲不振、胃部不快感		肝機能障害	発熱、かゆみ、発疹、黄疸（皮膚や白目が黄色くなる）、褐色尿、全身のだるさ、食欲不振等があらわれる。

3. 1ヵ月位服用しても症状がよくなるらない場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

【効能又は効果】体力中等度以下で、疲れやすく、汗のかきやすい傾向があるものの次の諸症：肥満に伴う関節の腫れや痛み、むくみ、多汗症、肥満症（筋肉にしまりのない、いわゆる水ぶとり）

【用法及び用量】次の量を1日3回食前又は食間に水又は白湯にて服用してください。

成人（15歳以上）1回4錠、15歳未満7歳以上1回3錠、7歳未満5歳以上1回2錠、5歳未満は服用しないこと

<用法及び用量に関連する注意> (1) 用法・用量を厳守してください。(2) 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。

【成分及び分量】ジープエルスリムLの1日量（12錠）中には防己黄耆湯エキス（1/2量）1300mgを含む。（ポワイ・オウギ各2.5g、ビャクジュツ・タイソウ各1.5g、カンソウ0.75g、ショウキョウ0.5gより抽出。）

添加物として、ステアリン酸Mg、CMC-Ca、セルロース、メタケイ酸アルミン酸Mg、水酸化Al/Mg、乳糖を含有する。

【保管及び取扱い上の注意】(1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所にチャックをしっかりしめて保管してください。(2) 小児の手の届かない所に保管してください。(3) 他の容器に入れ替えないでください。（誤用の原因になったり品質が変わります。）(4) 使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。(5) 水分が錠剤につきまると、変色又は色むらを生じることがありますので、水滴を落としたり、ぬれた手で触れないでください。

920002 95620002

製造販売元 中村薬品工業株式会社

奈良県高市郡高取町大字丹生谷31-32

お問い合わせ先、お客さま相談窓口 電話：0745-67-0038

受付時間 10:00～16:00（土、日、祝日を除く）

製造番号

使用期限

副作用および救済制度  
0120-149-931

TE-1

