項目 	内容
医薬品区分	配置用医薬品
薬効分類	防風通聖散 漢方製剤
承認販売名	
製品名	スリムゴールド
製品名(読み)	スリムゴールド
製品の特徴	
使用上の注意	■してはいけないこと (守らないと現在の症状が悪化したり,副作用が起こりやすく なる) 1. 本剤を服用している間は,次の医薬品を服用しないこと 他の瀉下薬(下剤). 2. 授乳中の人は本剤を服用しないか,本剤を服用する場合は
	授乳を避けること
	■相談すること
	1. 次の人は服用前に医師,薬剤師又は登録販売者に相談すること (1) 医師の治療を受けている人. (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人. (3) 体の虚弱な人(体力の衰えている人,体の弱い人). (4) 胃腸が弱く下痢しやすい人. (5) 発汗傾向の著しい人. (6) 高齢者. (7) 今までに薬などにより発疹・発赤,かゆみ等を起こしたことがある人. (8) 次の症状のある人. むくみ,排尿困難 (9) 次の診断を受けた人. 高血圧,心臓病,腎臓病,甲状腺機能障害 2. 服用後,次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので,直ちに服用を中止し,この文書を持って医師,薬剤師又は登録販売者に相談すること
	[関係部位:症状] 皮膚:発疹・発赤,かゆみ 消化器:吐き気・嘔吐,食欲不振,胃部不快感,腹部膨満,は げしい腹痛を伴う下痢,腹痛 精神神経系:めまい その他:発汗,動悸,むくみ,頭痛 まれに次の重篤な症状が起こることがある.その場合は直ち に医師の診療を受けること.

	[症状の名称:症状] 間質性肺炎:階段を上ったり,少し無理をしたりすると息切れがする・息苦しくなる,空せき,発熱等がみられ,これらが急にあらわれたり,持続したりする. 偽アルドステロン症,ミオパチー:手足のだるさ,しびれ,つっぱり感やこわばりに加えて,脱力感,筋肉痛があらわれ,徐々に強くなる. 肝機能障害:発熱,かゆみ,発疹,黄疸(皮膚や白目が黄色くなる),褐色尿,全身のだるさ,食欲不振等があらわれる. 腸間膜静脈硬化症:長期服用により,腹痛,下痢,便秘,腹部膨満等が繰り返しあらわれる. 3. 服用後,次の症状があらわれることがあるので,このような症状の持続又は増強がみられた場合には,服用を中止し,この文書を持って医師,薬剤師又は登録販売者に相談すること下痢,便秘 4. 1ヵ月位(便秘に服用する場合には1週間位)服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し,この文書を持って医師,薬剤師又は登録販売者に相談すること 5. 長期連用する場合には,医師,薬剤師又は登録販売者に相談すること 5. 長期連用する場合には,医師,薬剤師又は登録販売者に相談すること
効能・効果	のぼせを伴う肩こり, むくみ又は便秘
効能関連注意	
用法・用量	次の量を1日3回食前又は食間に,水又は白湯で服用してください. 成人(15歳以上):1回:4錠 15歳未満:服用しないこと
用法関連注意	用法及び用量を厳守してください.
	12錠中
成分分量	成分分量内訳防風 通聖 散料 乾燥(トウキ・シャクヤク・センキュウ・サンシシ・レンギョウ・ハッカ・ケイガイ・ボウフウ・マオウ各0.6g, ダイオウ0.75g, 乾燥硫酸ナトリウム0.375g, ビャクジュツ・キキョウ・オウゴン・カンゾウ・セッコウ各1g, カッセキ1.5g, ショウキョウ0.2g)
添加物	含水二酸化ケイ素,カルメロースカルシウム,ステアリン酸マグ ネシウム
保管及び取扱い上の注意	(1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管してください. (2) 小児の手の届かない所に保管してください. (3) 他の容器に入れ替えないでください(誤用の原因になったり品質が変わります.).
	(4) 配置期限を過ぎた製品は服用しないでください.
消費者相談窓口	

	会社名:大協薬品工業株式会社 住所:富山市水橋畠等173
販売会社	
剤形	錠剤
リスク区分等	第2類医薬品