

ご使用に際して、この説明書を必ず読んで下さい。  
また、必要な時に読めるよう本剤とともに保存して下さい。

第2類医薬品

(57)

## 一元乃錠剤 麻 黄 湯

## ⚠ 使用上の注意



## してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる)

1. 次の人は服用しないこと  
体の虚弱な人（体力の衰えている人、体の弱い人）。
2. 短期間の服用にとどめ、連用しないこと



## 相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
  - (1)医師の治療を受けている人。
  - (2)妊娠又は妊娠していると思われる人。
  - (3)胃腸の弱い人。
  - (4)発汗傾向の著しい人。
  - (5)高齢者。
  - (6)今までに薬などにより発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人。
  - (7)次の症状のある人。  
むくみ、排尿困難
  - (8)次の診断を受けた人。

高血圧、心臓病、腎臓病、甲状腺機能障害

2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	吐き気、食欲不振、胃部不快感
その他	発汗過多、全身脱力感

まれに下記の重篤な症状が起こることがある。その場合は直ちに医師の診療を受けること。

症状の名称	症 状
偽アルドステロン症、ミオパチー	手足のだるさ、しびれ、つっぱり感やこわばりに加えて、脱力感、筋肉痛があらわれ、徐々に強くなる。

3. 1ヶ月位（感冒、鼻かぜに服用する場合には5～6回）服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

## 〔効能・効果〕

体力充実して、かぜのひきはじめで、さむけがして発熱、頭痛があり、せきが出て身体のふしふしが痛く汗が出でないものの次の諸症：

感冒、鼻かぜ、気管支炎、鼻づまり

## 〔用法・用量〕

食前又は食間に服用する。

年齢	1回量	1日服用回数
大人	5錠	3回

## 〔成分・分量〕 1日量(15錠)中

日局	マオウ	5000mg
日局	キヨウニン	5000mg
日局	ケイヒ	4000mg
日局	カンゾウ	1500mg

より製した乾燥エキス1400mgを含有する。

添加物として、トウモロコシデンプン、乳糖、メタケイ酸アルミニン酸マグネシウム、ステアリン酸マグネシウムを含有する。

## 〔保管及び取扱い上の注意〕

- (1)小児の手のとどかない所に保管すること。
- (2)直射日光をさけ、なるべく湿気の少ない、涼しい所に密栓して保管すること。
- (3)誤用をさけ、品質を保持するために、他の容器に入れかえないこと。
- (4)保存の状況が悪いと、場合によっては虫、カビ等がつくことがありますので、上記の注意を必ず守って下さい。

本剤は、原料として天然の生薬を用いていますので、製品により多少色が異なったり、開栓後、吸湿により錠剤の色が濃くなる場合がありますが、効果には変わりありません。

### 〔お問い合わせ先〕

一元製薬株式会社「お客様相談室」

〒171-0043 東京都豊島区要町3-4-10

電話：03-3957-2997

○受付時間：9:00～17:00（土、日、祝祭日を除く）

副作用被害救済制度の問合せ先

(独)医薬品医療機器総合機構

<http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai.html>

電話 0120-149-931



一元製薬株式会社

東京都豊島区要町3-4-10