

タキザワの

漢方煎薬

第2類医薬品

5日分10包
126

麻子仁丸料「タキザワ」



株式会社タキザワ漢方廠

2011年12月(記載要領変更に伴う改訂)

漢方薬 麻子仁丸料「タキザワ」

△<使用上の注意>

11L

☒ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります。)

1. 次の人は服用しないでください。

生後3ヵ月未満の乳児

2. 本剤を服用している間は、次の医薬品を服用しないでください。

他の漢下薬(下剤)

3. 授乳中の人は本剤を服用しないか、本剤を服用する場合は授乳を避けてください。

☒ 相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

- (1) 医師の治療を受けている人
- (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人
- (3) 胃腸が弱く下痢しやすい人

2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性がありますので、直ちに服用を中止し、この袋を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関係部位	症 状
消化器	はげしい腹痛を伴う下痢、腹痛

3. 服用後、次の症状があらわれることがありますので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

下痢

4. 5~6日間服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この袋を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

【成分・分量】

マシニン	5.0g	コウボク	2.0g
シャクヤク	2.0g	ダイオウ	4.0g
キジツ	2.0g	キョウニン	2.0g
1日分(1包8.5g×2)17.0g			

【効能・効果】

体力中等度以下で、ときに便が硬く塊状などの次の諸症：便秘、便祕に伴う頭重・のぼせ・湿疹・皮膚炎・ふきでもの(にきび)・食欲不振(食欲減退)・腹部膨満・腸内異常醸酵・痔などの症状の緩和

【用法・用量】

1日2回朝夕の空腹時に、本品1包(1回分)を和紙袋入りのまま、水約300mLを加えて半量ぐらいまで煎じつめ、和紙袋とともに煎じかすを除き、右の量を服用してください。

年 齢	1 回 量
大人(15歳以上)	全 量
15歳未満 7歳以上	大人の2/3
7歳未満 4歳以上	大人の1/2
4歳未満 2歳以上	大人の1/3
2歳未満	大人の1/4

<用法・用量に関する注意>

- (1) 用法・用量を厳守してください。
- (2) 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。
- (3) 1歳未満の乳児には、医師の診療を受けさせることを優先し、止むを得ない場合にのみ服用させてください。

【保管及び取扱い上の注意】

- (1) 直射日光の当たらない温氣の少ない涼しい所に保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。
(誤用の原因になったり品質が変わることがあります。)



製造販売元

株式会社タキザワ漢方

さいたま市見沼区片柳412-1

お客様相談室048-688-7923

受付時間:9時~18時(月~金)

ホームページ:takizawa.asia

タキザワ漢方

検索



副作用被審救済制度の問合せ先

(独)医薬品医療機器総合機構

<http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai.html>

0120-149-931

