

この添付文書は本剤とともに保管し、服用の際には、よくお読みください。

漢方製剤

第2類医薬品

りゅうたんしゃかんとく

# 竜胆瀉肝湯エキス[細粒]93

本方は、「薛氏十六種」という本に載っている薬方です。瀉肝とは、「肝経の湿熱を去る」の意で、泌尿器の疾患に用いられる処方です。



## ●使用上の注意●



### してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなります)

次の人は服用しないでください。

生後3ヵ月未満の乳児



### 相談すること

1. 次の人は服用前に医師又は薬剤師に相談してください。

- (1) 医師の治療を受けている人
- (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人
- (3) 胃腸が弱く下痢しやすい人
- (4) 今までに薬により発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人

2. 次の場合は、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師又は薬剤師に相談してください。

(1) 服用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	食欲不振、胃部不快感

(2) 1ヵ月位服用しても症状がよくなる場合

3. 次の症状があらわれることがありますので、このような症状の継続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、医師又は薬剤師に相談してください。

下痢

## \*●効能・効果●

体力中等度以上で、下腹部に熱感や痛みがあるものの次の諸症：  
排尿痛、残尿感、尿のにごり、こしけ（おりもの）、頻尿

## ●用法・用量●

次の量を1日3回、食前又は食間に服用してください。  
(食間とは食後2～3時間を指します。)

年 齢	1 回 量	
	分包剤	大入り剤
大人(15才以上)	1 包	2.0g
15才未満7才以上	2/3包	1.3g
7才未満4才以上	1/2包	1.0g
4才未満2才以上	1/3包	0.7g
2才未満	1/4包	0.5g以下

### 〔用法・用量に関連する注意〕

- (1)用法・用量を厳守してください。
- (2)小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。
- (3)1才未満の乳児には、医師の診療を受けさせることを優先し、止むを得ない場合にのみ服用させてください。

## ●成分・分量●

本品3包(6.0g)又は6.0gは

トウキ……………2.5g	シャゼンシ……………1.5g
ジオウ……………2.5g	リュウタン……………0.5g
モクツウ……………2.5g	サンシシ……………0.5g
オウゴン……………1.5g	カンゾウ……………0.5g
タクシャ……………1.5g	

上記より製した竜胆瀉肝湯水製エキス7.0gを含有する細粒剤です。  
添加物としてメタケイ酸アルミン酸Mg、ヒプロメロース、デキストリン、乳糖、トウモロコシデンプン、香料を含有します。

## ●保管及び取扱い上の注意●

- (1)直射日光の当たらない、湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2)小児の手の届かない所に保管してください。
- (3)他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり、品質が変わることがあります。)
- (4)本剤は天然物を成分としていますので、製品により若干色調が異なることがあります。効果には変わりありません。
- (5)分包剤で1包を分割した残りを使用する場合には、袋の口を折り返して保管し、2日以内に使用してください。
- (6)使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。

## ●お問い合わせ先●

松浦漢方株式会社 薬事学術部

TEL (052)883-5131 受付時間 10:00～17:00 (土・日・祝日を除く)

発 売 元

**松浦漢方株式会社**  
名古屋市昭和区円上町24-21

製造販売元

 **松浦漢方株式会社**  
名古屋市緑区大高町寅新田36