



ご使用に際して、この説明書を必ず読んで下さい。  
また、必要な時に読めるよう本剤とともに保存して下さい。

第2類医薬品

59

錠剤 りょうけいじゅつかんとう  
**苓桂朮甘湯**

**⚠ 使用上の注意**



**相談すること**

- 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
  - 医師の治療を受けている人。
  - 妊婦又は妊娠していると思われる人。
  - 高齢者。
  - 今までに薬などにより発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人。
  - 次の症状のある人。  
むくみ
  - 次の診断を受けた人。  
高血圧、心臓病、腎臓病
- 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ

まれに下記の重篤な症状が起こることがある。その場合は直ちに医師の診療を受けること。

症状の名称	症 状
偽アルドステロン症、 ミオパチー	手足のだるさ、しびれ、つっぱり感やこわばりに加えて、脱力感、筋肉痛があらわれ、徐々に強くなる。

- 1ヵ月位服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
- 長期連用する場合には、医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

**〔効能・効果〕**

体力中等度以下で、めまい、ふらつきがあり、ときにのぼせや動悸があるものの次の諸症：  
立ちくらみ、めまい、頭痛、耳鳴り、動悸、息切れ、神経症、神経過敏

**〔用法・用量〕**

食前1時間、又は空腹時に服用する。

年 齢	1回量	1日服用回数
大人	4～6錠	3回
7～13歳迄	2～3錠	

**〈用法・用量に関する注意〉**

小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させること。

〔成分・分量〕（本剤100錠中）

		自社製別紙規格			
日局	ケイヒ末	5.2 g	日局	ケイヒ	5.8 g
日局	ソウシュツ末	5.2 g	日局	ソウシュツ	5.8 g
日局	カンソウ末	3.5 g	日局	カンソウ	4.2 g
日局	ブクリョウ末	8.6 g	日局	ブクリョウ	9.2 g

別紙規格水性工キス  
2.5g

〔保管及び取扱い上の注意〕

- (1)小児の手のとどかない所に保管すること。
- (2)直射日光をさけ、なるべく湿気の少ない、涼しい所に密栓して保管すること。
- (3)誤用をさけ、品質を保持するために、他の容器に入れかえないこと。
- (4)保存の状況が悪いと、場合によっては虫、カビ等がつくことが考えられますので、上記の注意を必ず守って下さい。

本剤は、原料として天然の生薬を用いていますので、製品により多少色が異なったり、開栓後、吸湿により錠剤の色が濃くなる場合がありますが、効果には変わりありません。

〔お問い合わせ先〕

一元製薬株式会社「お客様相談室」  
〒171-0043 東京都豊島区要町3-4-10  
電話：03-3957-2997  
○受付時間：9:00～17:00（土、日、祝祭日を除く）

副作用被害救済制度の問合せ先  
（独）医薬品医療機器総合機構  
<http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai.html>  
電話 0120-149-931



一元製薬株式会社

東京都豊島区要町3-4-10