



和漢薬本来の効き目をあなたに  
摩耶堂の浸煎薬

# ネオ雲仙湯

16種の生薬からなる  
日本生まれの和漢処方  
冷えからくる  
背中や腰の痛みに  
茶剤・1袋  
【効果】  
神経痛、リウマチ、関節炎、  
筋肉痛、腰痛、背痛、五十肩

【成分・分量】1袋(成人1日量)中に次の生薬を20.0g含有しています。

カンゾウ・・・1.0g ショウキョウ・・・1.0g ポウフウ・・・1.0g ボタンビ・・・1.2g  
ソウジョツ・・・1.0g タイソウ・・・1.0g シャクヤク・・・1.6g トウニン・・・1.0g  
ケイヒ・・・1.2g キョウニン・・・1.0g カッコン・・・2.0g ダイオウ・・・1.0g  
マオウ・・・2.0g ボウイ・・・1.6g ブクリョウ・・・1.2g ヨクイニン・・・1.2g

第②類医薬品

HR242A-03

この説明書きは本剤と  
ともに保管し、服用の際  
にはよくお読みください。

茶剤 **ネオ雲仙湯**

生薬製剤  
第②類医薬品  
20.0g×1袋

⚠ 使用上の注意

❌ **してはいけないこと** (守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります。)  
授乳中の人は本剤を服用しないか、本剤を服用する場合は授乳を避けてください。

🗨 **相談すること**

- 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。(1)医師の治療を受けている人(2)妊婦又は妊娠していると思われる人(3)体の虚弱な人(体力の衰えている人、体の弱い人)(4)胃腸の弱い人、胃腸が弱く下痢しやすい人(5)発汗傾向の著しい人(6)高齢者(7)薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人(8)次の症状のある人:むくみ、食欲不振、吐き気、嘔吐、軟便、下痢、排尿困難(9)次の診断を受けた人:甲状腺機能障害、糖尿病、心臓病、高血圧、腎臓病(10)次の医薬品を服用している人:瀉下薬(下剤)
- 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	食欲不振、胃部不快感、吐き気・嘔吐、げざしい腹痛を伴う下痢、腹痛
精神神経系	不眠、発汗過多、頻脈、動悸、全身脱力感、精神興奮
泌尿器	排尿障害

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症状
偽アルドステロン症、 ミオパチー	手足のだるさ、しびれ、つばり感やこばりに加えて、 脱力感、筋肉痛があらわれ、徐々に強くなる。

- 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。 軟便、下痢
- 1ヵ月位服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
- 長期連用する場合には、医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

【効能・効果】神経痛、リウマチ、関節炎、筋肉痛、腰痛、背痛、五十肩

【用法・用量】○成人1日1袋を3回・熱湯約100ml中にて振り出し、食前又は食間に温服してください。○成人1日1袋に水約500mlを加え約1/2量に煎じ詰め、食前又は食間の3回に分けて温服してください。○小児は成人の約1/2量宛服用してください。

<用法・用量に関連する注意>(1)用法・用量を厳守してください。(2)小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。

【保管及び取扱い上の注意】(1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。(2)小児の手の届かない所に保管してください。(3)他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わることがあります。)(4)一度開封した後は、品質保持の点からなるべく早く服用してください。(5)使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。



4 987210 113033

製造販売元

ロート製薬グループ



**摩耶堂製薬株式会社**

神戸市西区玉津町居住65-1

お問合せ先:「くすりの相談室」電話(078)929-0112  
受付時間:9時から17時30分まで(土、日、祝日、弊社休日を除く)

副作用被害救済制度の問合せ先 0120-149-931



使用  
期限

製  
造  
番  
号

HR242B-03