

## 皮膚病用内服薬

# ネオ小町錠

第2類医薬品

☆ネオ小町錠は、ニキビ、吹出物、肌荒れなどお肌のトラブルの改善に効果を発揮するとともに、お肌によりビタミン類(ビタミンB<sub>2</sub>やビタミンB<sub>6</sub>、ビタミンC等)を配合していますので、肌荒れを防止し、お肌の不調を整えます。

### 使用上の注意



#### してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなります。)

1. 次の人は服用しないでください。  
5歳未満の乳児・幼児  
(錠剤がのどにつかえることがあります。)
2. 授乳中の人は本剤を服用しないか、本剤を服用する場合は授乳を避けてください。



#### 相談すること

- \*\*1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
- (1) 医師の治療を受けている人
  - (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人
  - (3) 体の虚弱な人(体力の衰えている人、体の弱い人)
  - (4) 胃腸の弱い人、胃腸が弱く下痢しやすい人
  - (5) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人
  - (6) 次の症状のある人  
食欲不振、吐き気・嘔吐、軟便、下痢
  - (7) 次の医薬品を服用している人  
瀉下薬(下剤)
- \*\*2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。



関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消 化 器	食欲不振、胃部不快感、吐き気・嘔吐、はげしい腹痛を伴う下痢、腹痛

- \*\*3. 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。  
便秘、軟便、下痢
- \*\*4. 1ヵ月位服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

### 効能・効果

ニキビ、吹出物、シミ、ソバカス、色素異状沈着、ジン麻疹、湿疹、皮ふ炎、痒疹、アセモ、皮ふ掻痒症、口唇炎、口唇キ裂、アレルギー体質、シモヤケ、アカギレ等の治療と予防

## 用法・用量

通常1回3～5錠・1日2～3回、水又はお湯で服用してください。  
なお、年齢・症状に応じ適宜増減してください。

<用法・用量に関連する注意>

- (1)用法・用量を厳守してください。
- (2)小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。

## 成分・分量

10錠中に次の成分を含有しています。

成分	分量	成分	分量
キキョウ	200.0mg	サンキライ	200.0mg
センキュウ	200.0mg	ニンドウ	150.0mg
ダイオウ	250.0mg	ニコチン酸アミド	100.0mg
オウゴン	200.0mg	リボフラビン(ビタミンB <sub>2</sub> )	5.0mg
トウキ	150.0mg	ピリドキシン塩酸塩(ビタミンB <sub>6</sub> )	20.0mg
ポタンピ	200.0mg	アスコルピン酸(ビタミンC)	200.0mg
ヨクイニン	300.0mg	DL-メチオニン	80.0mg
ケイヒ	150.0mg	パントテン酸カルシウム	25.0mg
ケイガイ	150.0mg	乳酸カルシウム水和物	340.0mg
レンギョウ	150.0mg		

添加物としてマクロゴール、ゼラチン、タルク、メタケイ酸アルミン酸Mg、ステアリン酸Mg、銅クロロフィリンNa、アラビアゴム、白糖、セラック、ヒプロメロース、乳糖、セルロース、炭酸Ca、カルナウバロウを含有します。

<成分・分量に関連する注意>

- (1)本剤の服用により尿が黄色くなることがありますが、リボフラビン(ビタミンB<sub>2</sub>)によるものですから心配ありません。
- \* (2)ビタミンCを含有する製剤は、尿及び大便の検査値に影響を与えることがあります。従って、医師の検査を受ける場合は、本剤を服用していることを医師にお知らせください。

## 保管及び取扱い上の注意

- (1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管してください。
- (2)小児の手の届かない所に保管してください。
- (3)他の容器に入れ替えないでください。  
(誤用の原因になったり品質が変わることがあります。)
- (4)ビンのフタはよくしめてください。しめ方が不十分ですと湿気などのため変質することがあります。また、本剤をぬれた手で扱わないでください。
- (5)ビンの中の詰め物は、輸送中に錠剤が破損するのを防ぐためのものです。開封後は不要となりますので取り除いてください。
- (6)箱とビンの「開封年月日」記入欄に、ビンを開封した日付を記入してください。
- (7)一度開封した後は、品質保持の点からなるべく早く服用してください。
- (8)使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。



## その他

本剤の緑色は葉緑素(銅クロロフィリンナトリウム)でタール色素は含んでいません。

お問い合わせ先

株式会社メディカルリーチ「お客様相談窓口」

〒212-0016 神奈川県川崎市幸区南幸町 3-1-2 ニチエーイン川崎 25・2 階  
電話：0120-203-438 受付時間：10:00～18:00 (土・日・祝日を除く)

発売元

株式会社メディカルリーチ  
神奈川県川崎市幸区南幸町 3-1-2 ニチエーイン川崎 25・2 階



製造販売元

摩耶堂製薬株式会社  
神戸市西区玉津町居住 65-1