

服用に際しては、この説明文書を必ずお読みください。
また、必要な時に読めるよう大切に保存してください。

し けつ 止 血

（ 生 薬 製 剤 ）

- ◆「止血」は口内出血、歯齦出血、喀血、鼻血、痔出血、子宮出血、月経過多症を改善するために、12種類の生薬を配合して創りました弊社独自の製剤です。

⚠ 使用上の注意

⊗ してはいけないこと

（守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる）

次の人は服用しないこと

生後3カ月未満の乳児。



相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

- （1）医師の治療を受けている人。
- （2）妊婦又は妊娠していると思われる人。
- （3）胃腸が弱く下痢しやすい人。

2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

関係部位	症 状
消化器	食欲不振、胃部不快感、下痢

*まれに下記の重篤な症状が起こることがある。その場合は直ちに医師の診療を受けること。

症状の名称	症 状
腸間膜静脈硬化症	長期服用により、腹痛、下痢、便秘、腹部膨満等が繰り返しあらわれる。

3. 2週間位服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

*4. 長期連用する場合には、医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

効能・効果

口内出血、歯齦出血[※]、喀血、鼻血、痔出血、子宮出血、月経過多症の止血

※)「歯齦出血」とは、歯ぐき出血のことを示します。

用法・用量

食間に水又はお湯にて服用します。

年齢	1回量	1日服用回数
成人	1包	3回
7歳以上 15歳以下	成人の1/2量	
4歳以上 7歳未満	成人の1/3量	
2歳以上 4歳未満	成人の1/6量	
2歳未満	成人の1/10量	

食間とは…
食後2～3時間を
指します。

〈用法・用量に関連する注意〉

- (1) 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させること。
- (2) 1歳未満の乳児には、医師の診療を受けさせることを優先し、止むを得ない場合にのみ服用させること。

成分・分量

本品3包(6g)中、下記生薬を含有します。

ボタンピ末	----- 1.30g	オウレン末	----- 0.49g
シャクヤク末	----- 0.32g	オウバク末	----- 0.32g
トウキ末	----- 0.32g	サンシシ末	----- 0.32g
オウゴン末	----- 0.32g	ジオウ末	----- 1.30g
チモ末	----- 0.32g	アキョウ末	----- 0.32g
ゲンジン末	----- 0.32g	カロコン末	----- 0.32g

添加物は含有していません。

〈成分・分量に関連する注意〉

本剤は、生薬を原料として製造しておりますので、製品の色や味等に多少の差異が生ずることがありますが、品質には変わりありません。

保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わることがあります。)
- (4) 1包を分割した残りを使用する場合には、袋の口を折り返して保管し、2日以内に使用してください。
- (5) 使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。使用期限は外箱に記載しています。

お問い合わせ先

株式会社 建林松鶴堂 お客様相談室
電話 03-3843-3833
受付時間 9時から17時まで(土、日、祭日を除く)

製造販売元 たてばやししょうかくどう

株式会社 **建林松鶴堂**

〒335-0024 埼玉県戸田市戸田公園3-7