

* 2013年11月改訂（下線部追加）

ご使用に際して、この説明文書を必ずお読みください。
また、必要な時に読めるよう大切に保管してください。

第2類医薬品

吸血害虫忌避剤

MUHI

医薬品の虫よけ剤

ムヒの虫よけムシペール^α

販売名：ムヒの虫よけムシペール^α

ムヒの虫よけムシペール^αは虫よけ成分ディートが12%配合されていますので、虫よけ効果の持続時間が長く、蚊、アブ、ブユ(ブヨ)などの他、マダニ、ツツガムシに対しても効果があります。ムヒの虫よけムシペール^αは「重症熱性血小板減少症候群(SFTS)」「つつが虫病」の予防に役立つ、「医薬品」の忌避剤です。

特長

- ムヒの虫よけムシペール^αは医薬品の虫よけ剤です。
- 蚊、アブ、ブユ(ブヨ)などの他、マダニ、ツツガムシに対しても虫よけ効果があります。
- 虫よけ成分が12%配合されていますので、虫よけ効果が長く続きます。
- 吸い込みにくいノンガススプレータイプです。
- 外出や旅行、アウトドアなど、携帯に便利な容器です。

〈こんな時にお使いください〉

キャンプやハイキングに



海外旅行に



屋外での作業に



使用上の注意

してはいけないこと



(守らないと副作用が起こりやすくなります)

1. 次の部位には使用しないでください

創傷面、目の周囲、粘膜等。

相談すること



1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
(1)医師の治療を受けている人。
(2)薬などによりアレルギー症状(発疹・発赤、かゆみ、かぶれ等)を起こしたことがある人。
(3)湿疹やただれのある人。
2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性がありますので、直ちに使用を中止し、この説明文書をもって医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ、はれ等

*効能

蚊、ブユ(ブヨ)、サシバエ、アブ、ナンキンムシ、ノミ、イエダニ、マダニ、ツツガムシの忌避

成分とそのはたらき 有効成分(100mL中)

成 分	分量	は た ら き
ディート	12.0g	吸血害虫を忌避します。

添加物としてエタノール、香料を含有します。

*用法・用量

1. 蚊、ブユ(ブヨ)、サシバエ、アブ、ナンキンムシ、ノミ、イエダニ、マダニを忌避させる目的で使用する場合は、本剤の適量を用時、首筋、腕、足など皮ふの露出部分に噴霧してください。顔面などの場合には適量を一度手のひらに噴霧してから塗布してください。
2. ツツガムシを忌避させる目的で使用する場合は、本剤の適量を4~6時間毎に、皮ふの露出部分及びはきものやズボンのすそなどにむらなく噴霧してください。顔面などの場合には適量を一度手のひらに噴霧してから塗布してください。

<用法・用量に関連する注意>

- (1)本剤は吸血害虫に対する忌避剤であって、疾病の治療薬ではありません。
- (2)漫然とした使用をさげ、蚊、ブユ(ブヨ)等が多い戸外での使用等、必要な場合にのみ使用してください。
- (3)小児(12才未満)に使用する場合には、保護者等の指導監督のもとで、以下の回数を目安に使用してください。なお、顔には使用しないでください。
 - ・6カ月未満の乳児には使用しないでください。
 - ・6カ月以上2才未満は、1日1回。
 - ・2才以上12才未満は、1日1~3回。
- (4)目に入ったり、飲んだり、なめたり、吸い込んだりすることがないようにし、塗布した手で目をこすらないでください。万一目に入った場合には、すぐに大量の水又はぬるま湯でよく洗い流してください。また、具合が悪くなる等の症状が現れた場合には、直ちに、本剤にエタノールとティートが含まれていることを医師に告げて診療を受けてください。
- (5)本剤は外用にのみ使用し、内服しないでください。
- (6)次の物には付着させないでください。(変質する場合があります。)食物、食器、玩具、床や家具などの塗装面、メガネ、時計、アクセサリー類、プラスチック類、繊維製品、皮革製品、マニキュア等。
- (7)ストッキングなどの上に直接噴霧しないでください。(生地が傷む場合があります。)
- (8)特にツツガムシの忌避を目的とした場合には、さらに次のことに注意してください。
 - ①ツツガムシは見えにくいので、生息しているような場所に立ち入る前に塗布してください。また、濡れたり、汗をかいたりした場合は早めに塗り直しをしてください。
 - ②シャツ、ズボン、ストッキングなどの衣類に噴霧する時
 - ・繊維の種類によっては本剤により変質する場合があります。ウール(毛)、コットン(綿)、ナイロンは変質しませんが、ポリエステル系やポリウレタン系の合成繊維は変質しやすいので注意してください。
 - ・ストッキングにはポリウレタン系が多いので噴霧しないでください。
 - ③外出するときは、薬剤だけに頼らずにシャツやズボン、長靴などを使用し、肌を露出しないようにしてください。
 - ④帰宅後は、着用した衣類や靴は石鹸水あるいは熱湯につけ、本人はお風呂に入るようにしてください。

使用方法

- ・初めに白いプッシュボタンを5~6回程度「から押し」してから使用してください。
- ・肌などから約10cm離し、塗り残しのないようにむらなく噴霧してください。
- ・容器を逆さにしても噴霧できます。
- ・中身が少なくなった時は、容器を逆さにして使用すると液が出やすくなります。

保管及び取扱い上の注意

- (1)直射日光の当たらない涼しい所に保管してください。
- (2)小児の手のとどかない所に保管してください。
- (3)他の容器に入れかえないでください。(誤用の原因になったり品質が変わります。)
- (4)火気に近づけないでください。
- (5)使用期限(ケース底面及び容器底面に西暦年と月を記載)をすぎた製品は使用しないでください。使用期限内であっても、品質保持の点から開封後はなるべく早く使用してください。

ダニが媒介する主な感染症

- ①重症熱性血小板減少症候群：SFTS (マダニ)
SFTSウイルスを持っているマダニにさされることで感染します。潜伏期間は6~14日、主な症状は、発熱、消化器症状(吐き気、嘔吐、腹痛、下痢、下血)で、重症化すると死亡することがあります。
 - ②つつが虫病(ツツガムシ)
病原リケッチアを持っているツツガムシにさされることで感染します。潜伏期間は5~14日、主な症状は、倦怠感、発熱で、全身にかゆみのないブツブツがあらわれるのが特徴です。適切な治療を受けないと重症化することがあります。
- これらはいずれも届出が必要な4類感染症に指定されております。疑わしい症状があらわれましたら、早めに医師に相談してください。

お客様相談窓口：株式会社 池田模範堂 〒930-0394 富山県中新川郡上市町神田16番地
☎ 076-472-0911 (電話受付時間：月~金(祝日を除く) 9:00~17:00)

製造販売元

MUHI

株式会社 池田模範堂
富山県中新川郡上市町神田16番地

®登録商標

SS11