

産後の鉄分不足による貧血に

貧血による疲れ・だるさに



授乳中の方へ

授乳中のマスチゲン-S錠の服用は全く問題ありません。赤ちゃん・お母さんともマスチゲン-S錠に含まれる鉄分やビタミンは大事な栄養素です。

妊娠中の方へ

妊娠3週目まではマスチゲン-S錠の服用は問題ありません。4週目から15週目はおなかの赤ちゃんにくすりの影響が出やすい期間とされていますので、医師や薬剤師の先生にご相談下さい。16週から出産まではマスチゲン-S錠の服用は問題ありません。

第2類医薬品

貧血用薬



第2類医薬品

貧血用薬

マスチゲン®-S錠

MASTIGEN®-S TABLET

本剤について、何かお気づきの点がございましたら、お客様相談窓口までご連絡下さい。

お客様相談窓口 ☎06-6222-0441

土・日・祝日を除く 9:00~17:00



マスチゲン®-S錠

MASTIGEN®-S TABLET

この添付文書は、ご使用の前に必ずお読み下さい。
また、必要時に読めるよう保管しておいて下さい。

平成20年11月改訂

製造販売元
日本臓器製薬株式会社
大阪市中央区平野町2丁目1番2号

®登録商標

特長

- 鉄分・カルシウム・ビタミンB12・ビタミンC・ビタミンEを配合し、貧血による疲れ・だるさを治します。
- 産後の鉄分不足による貧血に効果的です。
- 思春期のお嬢様方の鉄分不足による貧血を改善します。
- ホウレン草約580gもしくは、サーロインステーキ約1280g中に含まれる鉄分と同量の鉄11.5mgを1錠中に含み貧血を治します。
- 携帯にも便利なシート包装。お試し用。
- 防腐剤無添加。

⚠ 使用上の注意

してはいけないこと

守らないと副作用が起こりやすくなります。

本剤を服用している間は、他の貧血用薬を服用しないで下さい。

相談すること

1. 次の人は服用前に医師または薬剤師にご相談下さい。

(1) 医師の治療を受けている人。

(2) 妊婦または妊娠していると思われる人。

(3) 本人またはご家族がアレルギー体質の人。

(4) 今までに薬によるアレルギー症状、例えば発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人。

2. 服用後、次の場合は、直ちに服用を中止し、この添付文書を持って医師または薬剤師にご相談下さい。

(1) 服用後、次の症状があらわれた場合。

関係部位	症 状
皮 脳	発疹・発赤、かゆみ
消 化 器	食欲不振、胃部不快感、恶心・おう吐、腹痛等

(2) 2週間位服用しても症状がよくならない場合。

3. 次の症状があらわれることがあるので、このような症状の継続または増強が見られた場合には、服用を中止し、医師または薬剤師にご相談下さい。

便秘、下痢

【成 分】 1錠中 フマル酸第一鉄 35mg(鐵として11.5mg) リン酸水素カルシウム(石灰由来) 25mg ビタミンB12 5μg ビタミンC 25mg ビタミンE酢酸エチル 5mg ビタミンB1硝酸塩 5mg ビタミンB2 1mg ビタミンB6 0.5mg ニコチン酸アミド 3mg 葉酸 0.5mg 硫酸銅 0.5mg 硫酸コリレト 0.05mg
添加物：炭酸カルシウム、セルロース、パレジヨデンプン、デキストリン、乳糖、ゼラチン、タルク、無水ケイ酸水加物、無水ケイ酸、白砂糖、ステアリン酸Mg、ヒマシ油、メタケイ酸アルミン酸Mg、カルナワロウ、醸化チタン、アラビゴム、セラック、赤色102号

【成分に関連する注意】 配合されているフマル酸第一鉄により便が黒くなることがあります。

【効能】 ●貧血による肉体疲労・食欲不振●産前産後・妊娠授乳期または諸出血に伴う鉄欠乏性貧血●病中病後・発熱性消耗性疾患などの場合の栄養補給

貧血による疲れ・だるさに



こんな時に…



産後の鉄分不足による貧血に



【用法・用量】

通常1回1錠、1日2回、食後に服用して下さい。なお、症状により適宜增量して下さい。
用法・用量に関連する注意

- 貧血症状が少しでも改善された方は、その後も根気よく服用して下さい。詳しくは薬剤師にご相談下さい。
- 2週間ほど服用されても症状が改善しない場合、他に原因があるか、他の疾患が考えられます。服用を中止し、医師または薬剤師にご相談下さい。
- 本剤の服用前30分は、玉露・煎茶・コーヒー・紅茶は飲まないで下さい。ほうじ茶・番茶・ウーロン茶・玄米茶・麦茶はさしつかえありません。
- 用法・用量を厳守して下さい。
- 5歳未満の乳幼児には服用させないで下さい。
- 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させて下さい。
- 錠剤の取り出し方：右図のように錠剤の入っているシート包装の凸部を指先で押して、裏面のアルミ箔を破り、取り出して下さい。誤ってそのまま飲み込んだりすると食道粘膜に突き刺さる等思わぬ事故につながります。

【保管および取り扱い上の注意】

- シート包装のアルミ袋開封後は、お早めに服用して下さい。
- シート包装から錠剤を取り出したら、すぐに服用して下さい。
- 直射日光を避け、なるべく湿気の少ない涼しいところに保管して下さい。冷蔵庫での保管はさけて下さい。急な温度変化は錠剤表面に水分を発生させ変色の原因になります。
- 落下等の衝撃により錠剤がカケたり亀裂が入り品質に影響を与えることがあります。お取扱いにご注意下さい。
- 小児の手の届かない所に保管して下さい。
- 他の容器に入れかえないで下さい。誤飲の原因になつたり品質が変わるとそれがあります。
- シート包装のアルミ袋内には乾燥剤が入っています。誤って服用しないようにご注意下さい。
- 使用期限をすぎた商品、使用前に開封された形跡のある商品は服用しないで下さい。

4種類からお選びいただけます

お試し用
32錠入
16日分
携帯にも便利な
シート包装



60錠入
30日分
お徳用
容量です。

240錠入
120日分
お徳用
容量です。

甘さをひかえたイチゴ味の
マスチゲン®-S 内服液
もございます。
第2類医薬品
効能：肉体疲労・妊娠
授乳期・病中病後・食欲
不振・栄養障害・発熱
消炎性疾患などの場合
の栄養補給・滋養強壮
・虚症体質