

服用に際して、この説明文書を必ずお読みください。
また、必要なときに読めるよう大切に保管してください。

第1類医薬品

販売名：セルペロイシン錠

血管補強・血圧降下剤

セルペロイシン錠

特徴

セルペロイシン錠は、ローウォルフィアセルベンチナ総アルカロイド等による降圧作用とコンドロイチン硫酸ナトリウム、アスコルビン酸等による動脈硬化の予防作用等がある薬です。高血圧症の緩和と動脈硬化の予防、血管補強による出血予防に効果をあらわします。



使用上の注意



してはいけないこと

[守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります]

授乳中の方は本剤を服用しないか、本剤を服用する場合は授乳を避けてください



相談すること

1. 次の人は服用前に医師又は薬剤師に相談してください

- (1) 医師の治療を受けている人。
- (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
- (3) 本人又は家族がアレルギー体質の人。
- (4) 薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- (5) 次の診断を受けた人。

消化性潰瘍、てんかん、腎不全、気管支ぜんそく

2. 次の場合は、直ちに服用を中止し、この説明文書を持って医師又は薬剤師に相談してください

- (1) 服用後、次の症状があらわれた場合。

関係部位	症 状
皮 ふ	かゆみ
消 化 器	恶心・嘔吐、食欲不振
精神神経系	頭痛、不眠、早朝覚醒
そ の 他	悲感気分



- (2) しばらく服用しても症状がよくならない場合。

3. 次の症状があらわれることがありますので、このような症状の継続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、医師又は薬剤師に相談してください

下痢

用法・用量

次の1回量を朝夕、白湯又は水にて服用してください。

服 用 目 的	1 回 量	服 用 回 数
諸種高血圧症の治療	2錠	1日2回
血圧降下後又は予防	1錠	

<用法・用量に関する注意>

- (1) 定められた用法・用量を厳守してください。
- (2) 15歳未満の小児は服用しないでください。

▼裏面もお読みください

効能・効果

- 本態性および腎性高血圧症
- 心臓機能障害あるいは大脳血行障害を伴う高血圧症
- 高血圧随伴症
- 動脈硬化の治療および予防
- 脳溢血・血管脆弱による出血予防

成分・分量 2錠中

はたらき	成 分	分量
中枢鎮静作用により血圧を下げます	ローウォルフィアセルベンチナ総アルカロイド	2mg
	コンドロイチン硫酸ナトリウム	100mg
	ルチン	60mg
	アスコルビン酸(ビタミンC)	50mg
	アミノエチルスルホン酸	50mg
	重酒石酸コリン	25mg
	イノシトール	20mg
	D L-メチオニン	20mg
	アミノフィリン	10mg

添加物：赤色102号、バレイショデンブン、タルク、炭酸Ca、ゼラチン、サラシミツロウ、ステアリン酸Mg、白糖、リン酸水素Ca、酸化チタン、カルボキシメチルセルロースNa、アラビアゴム、カルナウバロウ

保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管してください。
- (2) 小児の手のとどかない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れかえないでください。
(誤用の原因になったり品質が変わります)
- (4) 湿気により錠剤表面が変色することがありますので、ぬれた手で触れないでください。
- (5) ビンの中の詰め物は、輸送中の錠剤破損防止用です。開封時に捨ててください。
- (6) 箱の「開封年月日」記入欄にビンを開封した日付を記入しておいてください。
- (7) 使用期限を過ぎた製品は、服用しないでください。なお、使用期限内であっても開封後は品質保持の点からなるべく早く服用してください。
- (8) ビンの中に乾燥剤が入っています。服用しないでください。



本製品内容についてのお問い合わせは、お買い求めのお店、または下記にお願い申し上げます。

米田薬品株式会社 お客様相談窓口

電話 06-6562-7411 受付時間 10:00~17:00 (土、日、祝日を除く)



米田薬品株式会社
大阪市浪速区塩草3丁目2-2