

丹 陽 印

登録



商標

第3類医薬品

日本薬局方

吉見カゴソウ

500g



使用上の注意

**相談すること**

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください  
(1) 医師の治療を受けている人  
(2) 妊婦又は妊娠していると思われる人  
(3) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人
2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるため、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ

3. 1ヶ月位服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

**効能又は効果**

残尿感、排尿に際し不快感のあるもの

**用法及び用量**

成人(15歳以上)は1日量10gを、水約600mlをもって煮て約400mlに煮詰め、かすをこして取り取り、食前又は食間3回に分服する

**保管及び取扱い上の注意**

- (1) 直射日光の当たらない、湿気の少ない、涼しい所に保管してください
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください
- (3) 他の容器に入れ替えないでください
- (4) 開封後はなるべく早く使用し、長く放置しないでください
- (5) 煎薬の場合は、腐敗防止のため煎液を冷所に保管してください
- (6) 本品には防虫防カビのため脱酸素剤を封入しておりますが、これを本品と一緒に煎じたり食べたりしないようご注意ください
- (7) 服用に際しては、説明文をよくお読みください

吉見製薬株式会社

大阪市中央区船越町 2-1-17

電話 06(6941)7164

副作用被害救済制度の問合せ先  
(独) 医薬品医療機器総合機構  
<http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai.html>  
電話 0120-149-931 フリーダイヤル



4 951225 120430