

登録



商標

第3類医薬品

日本薬局方

吉見ソウハクヒ

500g



使用上の注意



相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
 - (1) 医師の治療を受けている人
 - (2) 妊娠又は妊娠していると思われる人
2. 1ヶ月位服用しても症状が良くならない場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

効能又は効果

尿量減少

用法及び用量

大人(15歳以上)は1日量5gを、水約600mlをもって煮て約400mlに煮つめ、滓をしぼって取り去り、食前または食間3回に分服する。

保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない、湿気の少ない、涼しい所に保管してください
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください
- (3) 他の容器に入れ替えないでください
- (4) 開封後はなるべく早く使用し、長く放置しないでください
- (5) 煎薬の場合は、腐敗防止のため煎液を冷所に保管してください
- (6) 本品には防虫防カビのため脱酸素剤を封入しておりますが、これを本品と一緒に煎じたり食べたりしないようにご注意ください

吉見製薬株式会社


大阪市中央区船越町 2-1-17

電話 06(6941)7164

副作用被害救済制度の問合せ先
(独) 医薬品医療機器総合機構

<http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai.html>

電話 0120-149-931 フリーダイヤル



4 951225 222028