

服用前にこの説明書を必ずお読みください。また、必要な時に読めるよう保管してください。

養命丸

養命丸は、血管を丈夫にする“ルチン”、おだやかな通じをつける“ダイオウ”、“センナ”等を配合し、高血圧症による種々の症状を緩和するお薬です。



使用上の注意

してはいけないこと



〔守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります。〕

1. 本剤を服用している間は、次の医薬品を服用しないでください。
他の瀉下薬（下剤）
2. 授乳中の人は本剤を服用しないか、本剤を服用する場合は授乳を避けてください。
3. 大量に服用しないでください。



相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。
 - (1) 医師の治療を受けている人。
 - (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
 - (3) 本人又は家族がアレルギー体質の人。
 - (4) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
 - (5) 次の症状のある人。（はげしい腹痛、吐き気・嘔吐）
 - (6) 次の診断を受けた人。（腎臓病）
2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。
 - (1) 服用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	はげしい腹痛、吐き気・嘔吐
 - (2) 5～6日間服用しても症状がよくなる場合
3. 次の症状があらわれることがあるので、このような症状の継続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。
下痢
4. 1週間位服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。

裏面もお読みください。

□効能又は効果

- 1) 高血圧症による頭痛・肩のこり・のぼせ・耳なり・めまい。
- 2) 便秘。

□用法及び用量

次の量を、水又は白湯にて各食後（30分）服用してください。

年齢	1 回量	1 日服用回数
大人(15才以上)	20粒	2 回
15才未満	服用しないでください	

〈用法・用量に関連する注意〉

用法・用量を厳守してください。

□成分及び分量(40粒 1日量 1.5g 中)

ルチン	0.13 g
ダイオウ末	0.55 g
センナ末	0.53 g
カノコソウ末	0.01 g
ケイヒ末	0.06 g
リン酸水素カルシウム	0.04 g
重質炭酸マグネシウム	0.02 g
ショウキョウ末	0.06 g
サンキライ末	0.02 g

添加物として、アセナクを含有します。

□保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。
(誤用の原因になったり品質が変わります。)
- (4) 配置期限又は使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。

〈お問い合わせ先〉

本剤のご使用により、何かお気付きの点がございましたら、下記までご連絡いただきますようお願い申し上げます。

養命製薬株式会社「お客様相談窓口」

電話 0766-53-1226

受付時間 9：00～16：00（土・日・祝日を除く）

副作用被害救済制度 ☎0120-149-931



製造販売元 養命製薬株式会社



本社 〒939-0418 富山県射水市布目沢622-6

富山営業所 〒930-0853 富山県富山市永楽町7-10